

## (26) ばれいしょ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
疫病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		500～1000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	ばれいしょ
	フロンサイト水和剤	フルアジンアム水和剤	29		1000～2000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ばれいしょ
					500倍	25g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ばれいしょ
					800倍	40g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ばれいしょ
黒あざ病	バリダシン粉剤DL	バリダマイシン粉剤	U18		種いも重量の0.3%		植付前	種いも粉衣	1回	ばれいしょ
	リゾレックス水和剤	トルクロスメチル水和剤	14		50～100倍	-	貯蔵前又は植付け前	種いも浸漬(10分以内)	1回	ばれいしょ
そうか病	アタッキン水和剤	ストレプトマイシン・チオファネートメチル水和剤	1,25		40～60倍	-	植付前	5～10秒間種いも浸漬	1回	ばれいしょ
					40倍	種いも100kg当り2.5～3g	植付前	種いも散布	1回	ばれいしょ
	フロンサイト粉剤	フルアジンアム粉剤	29		30～40kg/10a		植付前	全面土壌混和	1回	ばれいしょ
軟腐病	アグリマイシン-100	オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤	25,41		1000～1600倍	100～300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	ばれいしょ
アブラムシ類	アデイオン乳剤	ヘルメトリン乳剤	3A		2000～3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ばれいしょ
	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a(1～2g/株)		植付時	作条散布	1回	ばれいしょ
	ジエース粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～6kg/10a		植付時	作条散布	1回	ばれいしょ
ケラ	ダインノ粒剤3	ダインノ粒剤	1B		6～9kg/10a		植付前	土壌混和	1回	ばれいしょ
テントウムシダマシ幼虫	オルトラン水和剤	アセフェート水和剤	1B		1000倍	100～300g/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	ばれいしょ
テントウムシダマシ類	アデイオン乳剤	ヘルメトリン乳剤	3A		2000～3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	ばれいしょ
ネリムシ類	ダインノ粒剤3	ダインノ粒剤	1B		6～9kg/10a		植付前	土壌混和	1回	ばれいしょ