

(13) だいこん

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
亀裂褐変症(リジ外ニ菌)	バシタック水和剤75	メブロニル水和剤	7		1000～1500倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	3回以内	だいこん
	バリダシ粉剤DL	バリダマイシン粉剤	U18		20kg/10a		収穫7日前まで	株元散布	4回以内	だいこん
黒斑細菌病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
白さび病	ピシロックフロアブル	ピカルブトキサ水和剤	U17		1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん
軟腐病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
	コサド 3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類
	スターナ水和剤	オキシニク酸水和剤	31		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	だいこん
	バイクーパ-水和剤	非病原性エルビニアカトボ-ラ水和剤	「- (生)」		500～2000倍	150～300g/10a	発病前～発病初期	散布	-	野菜類(かぼちゃ、ズッキーニを除く)
ワカ症	ピシロックフロアブル	ピカルブトキサ水和剤	U17		1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	だいこん
アオムシ	アタロン乳剤	クロルフルアスロン乳剤	15		2000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	エスマルクDF	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300g/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ハクサップ水和剤	フェンバレート・マラソン水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん
	プレオフロアブル	ピリダリル水和剤	UN		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ランネット45DF	メソシル水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
アブラムシ類	オルトラン粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん
	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	1B		3～4kg/10a		は種前	作条散布	1回	だいこん
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		2000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		2000～3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	6回以内	だいこん
キヌダノミハムシ	フォーエス粒剤	テフルリン粒剤	3A	劇	4～9kg/10a		は種時	播溝土壌混和	1回	だいこん
					6～9kg/10a		は種時	全面土壌混和	1回	だいこん
					6kg/10a		収穫14日前まで	株元散布	1回	だいこん
コガ	アタロン乳剤	クロルフルアスロン乳剤	15		2000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	エスマルクDF	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300g/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～1500倍	100～300g/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	トアロー水和剤CT	BT水和剤	11A		1000～2000倍	100～300g/10a	発生初期 但し収穫前日まで	散布	-	野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)
	トルネット エースDF	インドキサカルブ水和剤	22A		2000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
パダソンSG水溶剤	カルタップ水溶剤	14	劇	1500倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん	

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
コナガ	プロフロアブル	ピリダリル水和剤	UN		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	ランネット45DF	メソミル水和剤	1A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
ネキリムシ類	カホス粉剤	イキサチオン粉剤	1B		6kg/10a		は種時	土壌表面散布	1回	だいこん
								土壌混和处理		
	テパノ5%ピト	NAC粒剤	1A		3～6kg/10a		収穫30日前まで	株元散布	4回以内	だいこん
	ネキリエースK	イキサチオン粒剤	1B		3kg/10a		は種時又は定植時	土壌表面株元 処理	1回	だいこん
ネグサレセンチュウ	ネマクリーン粒剤	フルビラム粒剤	"[-] (I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ビラム粒剤	フルビラム粒剤	"[-] (I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
ネコブセンチュウ	ネマクリーン粒剤	フルビラム粒剤	"[-] (I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
	ビラム粒剤	フルビラム粒剤	"[-] (I*)		20kg/10a		は種前	全面土壌混和	1回	だいこん
ハイマダラノメイガ	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	だいこん
	トルネードE-DF	インドキサカルブ水和剤	22A		2000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	だいこん
	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド水和剤	28		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
ヨトウムシ	アタプロン乳剤	クロルフルアスロン乳剤	15		2000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	だいこん
	エスマルクDF	BT水和剤	11A		1000倍	100～300g/10a	発生初期 但し、収穫前日まで	散布	-	野菜類
	ハクサップ水和剤	フェンハレレート・マラソン水和剤	1B,3A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫35日前まで	散布	3回以内	だいこん
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	だいこん
	マトリックフロアブル	クロマフェジト水和剤	18		2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	だいこん