

(24) えだまめ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
茎疫病	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
		LM水和剤	A			8mL				
黒根腐病	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
		LM水和剤	A			8mL				
紫斑病	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
		LM水和剤	A			8mL				
苗立枯病(ビ [®] シム菌)	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
		LM水和剤	A			8mL				
アブラムシ類	クルーザ [®] -FS30	チアマトキサム水和剤	4A		乾燥種子1kg当り原液6mL		は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
カメムシ類	アグロスリン乳剤	シペ [®] ルメトリン乳剤	3A	劇	2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	えだまめ
	アルパ [®] リン顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
	スタークル顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
ダイズヤマトバエ	アルパ [®] リン顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
	スタークル顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
タバコバエ	クルーザ [®] -FS30	チアマトキサム水和剤	4A		乾燥種子1kg当り原液6mL		は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
ネリムシ類	クルーザ [®] -FS30	チアマトキサム水和剤	4A		乾燥種子1kg当り原液6mL		は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
フタスジヒメムシ	アグロスリン乳剤	シペ [®] ルメトリン乳剤	3A	劇	2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	えだまめ
	アルパ [®] リン顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		3000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
	クルーザ [®] -FS30	チアマトキサム水和剤	4A		乾燥種子1kg当り原液6mL		は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
	クルーザ [®] -MAXX	チアマトキサム・フルジ [®] オキソニル・メタラキシ	12,4,4		原液	乾燥種子1kg当り	は種前	塗沫処理	1回	えだまめ
	スタークル顆粒水溶剤	ジ [®] ノテフラン水溶剤	4A		3000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	えだまめ
マメシクイガ	アグロスリン乳剤	シペ [®] ルメトリン乳剤	3A	劇	2000倍	100~300 μ L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	えだまめ