

(9) いちご

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
萎黄病	ペンレート水和剤	ペンシル水和剤	1		500倍	-	仮植前	1～3時間苗根部浸漬	1回	いちご
					500倍	100mL/株	本圃定植後 但し、収穫30日前まで	灌注	1回	いちご
					500倍	50～100mL/株	育苗期	灌注	3回以内	いちご
うどんこ病	アフェットフロアブル	ペンチオラト水和剤	7		2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	サンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド乳剤	「-」		300～600倍	150～500 μ L/10a	収穫前日まで	散布	-	野菜類(なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く)
	シグナムWDG	ピラロクストビン・ボスカリド水和剤	11,7		2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	フルビカフロアブル	メカニピリム水和剤	9		2000～3000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
					50倍	5 μ L/10a	収穫前日まで	常温煙霧	3回以内	いちご
	ポリキシンAL水和剤	ポリキシン水和剤	「-」(I*)		1000倍	100～300 μ L/10a	収穫開始14日前まで	散布	3回以内	いちご
モレスタン水和剤	キキサン系水和剤	"UN(I*)		3000～4000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご	
じゃのめ病	トリフミン水和剤	トリフルミゾール水和剤	3		3000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	いちご
炭疽病	アントラコール顆粒水和剤	プロピネブ水和剤	M3		500倍	150～300 μ L/10a	仮植栽培期	散布	6回以内	いちご
	シグナムWDG	ピラロクストビン・ボスカリド水和剤	11,7		2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	ジマンダ イセン水和剤	マンゼブ水和剤	UN*,M03		600倍	100～300 μ L/10a	仮植栽培期 但し収穫76日前まで	散布	6回以内	いちご
	セビアーフロアブル20	フルジキソニル水和剤	12		1000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
灰色かび病	アフェットフロアブル	ペンチオラト水和剤	7		2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	シグナムWDG	ピラロクストビン・ボスカリド水和剤	11,7		1500～2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	スミレックス水和剤	プロシミドン水和剤	2		2000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	セビアーフロアブル20	フルジキソニル水和剤	12		1000～1500倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	フルビカフロアブル	メカニピリム水和剤	9		2000～3000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	いちご
	ポリキシンAL水和剤	ポリキシン水和剤	「-」(I*)		1000倍	100～300 μ L/10a	収穫開始14日前まで	散布	3回以内	いちご
	ロブテール水和剤	イプロソニオン水和剤	2		1500倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	いちご
アブラムシ類	エコピタ液剤	還元澱粉糖化物液剤	「-」		100倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	-	いちご
	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		2000～3000倍	100～300 μ L/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	いちご
イトトンボ	ランネット45DF	メソシル水和剤	1A	劇	1000倍	100～300 μ L/10a	育苗期	散布	4回以内	いちご
				劇	1000倍	100～300 μ L/10a	定植後生育初期	散布	4回以内	いちご
コガネムシ類幼虫	ランネット45DF	メソシル水和剤	1A	劇	1000～2000倍	2～3 μ L/m ²	移植活着後(育苗期)	灌注	4回以内	いちご
ハダニ類	カネマイトフロアブル	アセキノシル水和剤	20B		1000～1500倍	150～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	1回	いちご
	ダニサラバフロアブル	シルメトフェン水和剤	25A		1000倍	100～350 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご
	マイトコーネフロアブル	ピフェナゼート水和剤	20D		1000倍	100～300 μ L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	いちご