

(8) かぼちゃ

RPA

| 病害虫名 | 薬剤名 | 農薬の種類 | RAC | 毒劇 | 使用濃度 | 使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 | 作物名 |
|---------|-------------|---------------------|---------|------------|--------------|----------|------|------|------|-----|
| 疫病 | ジマンダイン水和剤 | マンダイン水和剤 | UN*,M03 | 600倍 | 100~300㎕/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | かぼちゃ | |
| うどんこ病 | ジナムWDG | ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤 | 11,7 | 1500~2000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | かぼちゃ | |
| | パンショTF顆粒水和剤 | シルフェナミド・トリフルミゾール水和剤 | 3,U6 | 2000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | かぼちゃ | |
| | モレスタン水和剤 | キノキサン系水和剤 | UN*,M10 | 2000~4000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | かぼちゃ | |
| べと病 | ジマンダイン水和剤 | マンダイン水和剤 | UN*,M03 | 600倍 | 100~300㎕/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | かぼちゃ | |
| アフムシ類 | マラソン乳剤 | マラソン乳剤 | 1B | 2000~3000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | かぼちゃ | |
| | マラソン粉剤3 | マラソン粉剤 | 1B | 3kg/10a | | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | かぼちゃ | |
| カリハムシ | マラソン乳剤 | マラソン乳剤 | 1B | 1000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | かぼちゃ | |
| カリハムシ幼虫 | ダイアジノン粒剤3 | ダイアジノン粒剤 | 1B | 6~9kg/10a | | 植付時 | 土壤混和 | 1回 | かぼちゃ | |
| タネバエ | ダイアジノン粒剤3 | ダイアジノン粒剤 | 1B | 5~8kg/10a | | は種時又は植付時 | 土壤混和 | 2回以内 | かぼちゃ | |
| ハダニ類 | マラソン乳剤 | マラソン乳剤 | 1B | 2000~3000倍 | 100~300㎕/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | かぼちゃ | |
| | マラソン粉剤3 | マラソン粉剤 | 1B | 3kg/10a | | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | かぼちゃ | |