

## (12) かぶ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
根こぶ病	ダコソイル	TPN粉剤	M5		20～40kg/10a		は種前	作条施用土壌混和	1回	かぶ
	ネジシロ粉剤	フルスファミド粉剤	36		20kg/10a		は種又は定植前	作条土壌混和	1回	かぶ
					30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	かぶ
	フロンサイト粉剤	フルアジナム粉剤	29		30～40kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	かぶ
アオムシ	トアローフロアブルCT	BT水和剤	11A		1000～2000倍		発生初期 但し 収穫前日まで	散布	-	野菜類
	マラソン乳剤50	マラソン乳剤	1B		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
アブラムシ類	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		2000～3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
カブラハチ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	かぶ
キヌズノミハムシ	ハチハチ乳剤	トルフェンピラト乳剤	"21A(I*)	劇	2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	1回	かぶ
	フォース粒剤	テフルリン粒剤	3A	劇	4kg/10a		は種時	播溝土壌混和	1回	かぶ
	モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリト水溶剤	4A	劇	2000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	1回	かぶ
コナガ	トアローフロアブルCT	BT水和剤	11A		1000～2000倍		発生初期 但し 収穫前日まで	散布	-	野菜類
ハイマダラノメイガ	ハチハチ乳剤	トルフェンピラト乳剤	"21A(I*)	劇	2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	1回	かぶ
ヨトウムシ	トアロー水和剤CT	BT水和剤	11A		500～1000倍	100～300g/10a	発生初期 但し 収穫前日まで	散布	-	野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)