

2 花き除草剤

(1) 使用上の注意事項

- ① 使用薬量は散布実面積当りの量を厳守する。
- ② 土壌処理剤は整地後または畦立後表土を均平にし、土壌表面に均一に散布する。表土が乾いている場合は雨が降ってから散布する。
- ③ 粘土質の透水の悪い圃場では薬量を減らす。砂質地は薬効が少なく、薬害が出易いので注意する。
- ④ 土壌処理後、敷わら、もみがらマルチの併用は抑草効果を高める。
- ⑤ マルチ、トンネル、ハウスでは薬害が出易いので薬量を少なめにする。また、極端な高温乾燥時は散布しないようにする。
- ⑥ 散布にあたっては、除草剤専用の散布器具を使用し、噴口は必ずフード付きのものを使用する。
- ⑦ 散布にあたっては、メガネ、マスク、防除衣、手袋などを必ず着用する。

(2) 使用方法

作物名	除草剤名	適用雑草名	使用基準		10アール当たり使用量		注意事項
			時期	回数	薬量	希釈水量	
ユリ	トリアノキサイド乳剤 トリフルリン 44.5% ☉	一年生雑草 (ユクサ科、カヤウグサ科、 キク科、アブラ稔科)	植付後 ～ 萌芽前	1	200～300 ml	100 ℓ	<全面土壌散布> ・散布は均一に、または夕方や曇った日に実施する。 ・土壌が乾燥している場合、土壌を適当に湿らせるか、あるいは降雨後に散布する。
スイセン			萌芽前	1	200～300 ml	100 ℓ	
キク (露地栽培)			定植後	1	200～300 ml	100 ℓ	
スイセン	プリグロックSL ジクワット 7.0% パラコート 5.0% ☉	一年生雑草	萌芽前 (雑草生育期)	3	600～1,000 ml	100～150 ℓ	<雑草茎葉散布> ・医薬用外毒物。取扱いには特に注意する。 ・有用作物に飛散させない。
			畦間処理: 雑草生育期 (草丈20cm以下)				
花き類・ 観葉植物 (チューリップ、スイセンを 除く)			畦間処理: 雑草生育期 (草丈20cm以下)	3	600～1,000 ml	100～150 ℓ	
キク	ゴーゴーサン乳剤 ペンディメタリン 30.0%	一年生雑草	定植前 (雑草発生前)	1	200～400 ml	70～150 ℓ	<全面土壌散布> ・キク科雑草とツユクサには効果が劣る。 ・土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、希釈水量を多めにするか降雨後に散布する。
			定植後 (雑草発生前)				

作物名	除草剤名	適用雑草名	使用基準		10アール当たり使用量		注意事項	
			時期	回数	薬量	希釈水量		
キク	ナブ乳剤 セトキシム 20.0%	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5葉期	3	150～200 ml	100～150 ℓ	<雑草茎葉散布又は全面散布> ・効果が発現するまでに7～10日を要する。 ・広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果がない。	
樹木類	ナブ乳剤 セトキシム 20.0%	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5葉期	3	150～200 ml	100 ℓ	<雑草茎葉散布又は全面散布>	
	バスタ液剤 グルホシネート 18.5%	一年生雑草	雑草生育期	3	300～500 ml	100～150 ℓ	<雑草茎葉散布>	
樹木等 (公園・庭園・堤とう・ 駐車場・道路・運動 場・宅地・鉄道のり 面など)	ブリグロックSL ジクワット 7.0% パコート 5.0%	一年生雑草	雑草生育期	3	800～1,000 ml	100～150 ℓ	<雑草茎葉散布> ・医薬用外毒物。取扱いには特に注意する。 ・植栽地を除く樹木等の周辺地。	
		多年生雑草			1,500～2,000 ml			
		スギナ	スギナ生育期		1,000～2,000 ml			
	バスタ液剤 グルホシネート 18.5%	一年生雑草	雑草生育期	3	500～1,000 ml	100～200 ℓ	<雑草茎葉散布> ・植栽地を除く樹木等の周辺地。	
		多年生雑草			1,000～2,000 ml			
	タッチダウン iQ グリホサートカリウム塩 44.7%	一年生雑草	雑草生育期	3	250～500 ml	10～100ℓ	<雑草茎葉散布> ・植栽地を除く樹木等の周辺地。	
		多年生雑草			500～1,000 ml			
		スギナ	雑草生育期		1,500～2,000 ml			25～100ℓ
		ススキ、クズ	雑草生育期		1,000～2,000 ml			50～100ℓ
		ササ類	雑草生育期					
		雑かん木	雑草生育期					25～100ℓ
	ラウンドアップ マックスロード グリホサートカリウム塩 48.0%	一年生雑草	雑草生育期	3	200～500 ml	通常散布 50～100 ℓ	<雑草木茎葉散布> ・植栽地を除く樹木等の周辺地。	
多年生雑草			500～1,000 ml		少量散布 25～50 ℓ			
一年生及び多年生雑草					少量散布 5～25 ℓ			
スギナ			1,500～2,000 ml		通常散布			
ススキ、ヒレハリソウ、クズ等のつる性多年生雑草、ササ類、雑かん木			1,000～2,000 ml		50～100 ℓ 少量散布 25～50 ℓ			
カソロン粒剤 4.5 DBN 4.5%	一年生雑草、 多年生広葉雑草	雑草発生前～発生始期	3	8～12 kg		<全面土壌散布> ・植栽地を除く樹木等の周辺地。		
	スギナ			8～15 kg				