

(27) かんしょ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒斑病	ベンレート水和剤20	チラム・ベンゾミル水和剤	1,M3		200倍	-	植付前	30分間さし苗基部浸漬	1回	かんしょ
					20倍	-	植付前	1分間さし苗基部浸漬	1回	かんしょ
	ベンレート水和剤	ベンゾミル水和剤	1		500～1000倍	-	植付前	20～30分間苗基部浸漬	1回	かんしょ
					種いも重の0.4%	-	植付前	種いも粉衣	1回	かんしょ
アブラムシ類	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	3A		1000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	かんしょ
コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤	1B			5～10kg/10a	作付前及び収穫30日前まで	土壌混和	3回以内	かんしょ
ナカシロシバ	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	3A		1000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	かんしょ
ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	3A		1000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	かんしょ
ハリガネムシ類	フォース粒剤	テフルリン粒剤	3A	劇		9kg/10a	植付前	全面土壌混和又は作条 土壌混和	1回	かんしょ