

## (6) メロン

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
うどんこ病	ジ-ファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・銅水和剤	M1,NC		750~1000倍	150~500g/10a	収穫前日まで	散布	-	野菜類(なすを除く)
	トリフミン水和剤	トリフルミゾール水和剤	3		3000~5000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	メロン
	パレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	うり類(成熟)
	パンチョTF顆粒水和剤	シフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤	3,U6		2000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	メロン
	ペジセイバー	ペンチオラト・TPN水和剤	7,M5		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	メロン
	モルスタン水和剤	キキサリン系水和剤	UN*,M10		100g/10a	5g/10a	収穫3日前まで	常温煙霧	10回以内	メロン
				2000~4000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	10回以内	メロン	
疫病	ジマンダ イセン水和剤	マンゼブ水和剤	UN*,M03		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
菌核病	パレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	うり類(成熟)
つる枯病	ジマンダ イセン水和剤	マンゼブ水和剤	UN*,M03		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	トップジンMペースト	チオファネートメチルペースト剤	1		原液		発病初期 但し、収穫21日前まで	塗布	1回	メロン
	パレード 2070アブル	ピラジフルミド水和剤	7		2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	うり類(成熟)
	ロブラル水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	メロン
斑点細菌病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500倍	100~300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
	カスミンボルト-	カスカマイシン・銅水和剤	24,M1		1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	コサトボルト-	銅水和剤	M1		1000倍		-	散布	-	野菜類
べと病	ジマンダ イセン水和剤	マンゼブ水和剤	UN*,M03		400~600倍	100~300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	メロン
	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		700~1000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	5回以内	メロン
	ベトファイター顆粒水和剤	シモキサニル・ペンチアハリカルブイソプロピル水和剤	27,40		2000倍	100~300g/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	メロン

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
アブラムシ類	刈刈水和剤40	アライカルブ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	トマト
	サンライトフロアブル	ピリダベ水和剤	21A	劇	1000～1500倍	100～300g/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	トマト
	ダントツ粒剤	クロチアジソン粒剤	4A		1～2g/株	育苗期後半	株元処理	1回	トマト	
					1～2g/株	定植後 但し、収穫前日まで	株元散布	3回以内	トマト	
					1～2g/株	定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト	
	プロロッ粒剤オメガ	シアントラニプロール粒剤	28		2g/株	育苗期後半～定植時	株元散布	1回	トマト	
ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1～2g/株	定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト		
				1g/株	育苗期	株元処理	1回	トマト		
ウリメイガ	刈刈水和剤40	アライカルブ水和剤	1A	劇	1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	トマト
ウリハムシ	マラソン乳剤	マラソン乳剤	1B		1000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	トマト
コナジラミ類	ダントツ粒剤	クロチアジソン粒剤	4A		1～2g/株	育苗期後半	株元処理	1回	トマト	
					1～2g/株	定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト	
	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1～2g/株	定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト	
					1g/株	育苗期	株元処理	1回	トマト	
タネバエ	ダアジソン粒剤3	ダアジソン粒剤	1B		5～8kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	トマト
トマトハモグリバエ	ダントツ粒剤	クロチアジソン粒剤	4A		2g/株		定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト
ネコブセンチュウ	ネマキック粒剤	イミシアホス粒剤	1B		15～20kg/10a		定植前	全面土壌混和	1回	トマト
ミナミキイロアザミウマ	ダントツ粒剤	クロチアジソン粒剤	4A		2g/株		定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト
	ベストガード粒剤	ニテンピラム粒剤	4A		1～2g/株		定植時	植穴処理土壌混和	1回	トマト