

## (19) らっきょう

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名	
乾腐病	テ・イ・トラベックス油剤	メチルイソシアネート・D-D油剤	0,8A,8F	劇	30～40%	10a	は種又は植付の 21日前まで	圃場を耕起・整地し た後、所定量を深さ 約12～15cmに注入 し、直ちに覆土・鎮圧 1回 する。薬剤処理7～ 14日後にガス抜き作 業を行う。		らっきょう	
	トリミン水和剤	トリフルミン水和剤	3		50倍	-	植付前	5～30分間種球浸漬 1回		らっきょう	
	ベントレート水和剤20	チラム・ベノミル水和剤	1,M3		200倍	-	植付前	30分間種球浸漬 1回		らっきょう	
	ベントレート水和剤	ベノミル水和剤	1		500倍	-	植付直前	30分間種球浸漬 1回		らっきょう	
白色疫病	フォリオゴールド	メタキシム・TPN水和剤	4,M5		1000倍	100～400%	10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	らっきょう
	フロンスイト水和剤	フルアジナム水和剤	29		1000倍	100～300%	10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	らっきょう
	ベトファイト顆粒水和剤	シモキサニル・ベノチアパリカルブイソプロピル水和剤	27,40		2000倍	100～300%	10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	らっきょう
さび病	アミスター2070アブル	アゾキシストロビン水和剤	11		2000倍	100～300%	10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	らっきょう
灰色かび病	フロンスイト水和剤	フルアジナム水和剤	29		2000倍	100～300%	10a	収穫14日前まで	散布	5回以内	らっきょう
	ロブテール水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000倍	100～300%	10a	収穫30日前まで	散布	3回以内	らっきょう
雑草	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート粒剤	1B		15kg/10a		植付前	植溝土壌混和	1回	らっきょう	
雑草類	トクチオン細粒剤F	プロチオホス粉粒剤	1B		6kg/10a		定植時	植溝土壌混和	1回	らっきょう	
	フォース粒剤	テフルリン粒剤	3A	劇	6～9kg/10a		収穫14日前まで	株元散布	1回	らっきょう	
					9kg/10a		定植前	植溝土壌混和	1回	らっきょう	
					9kg/10a		定植前	全面土壌混和	1回	らっきょう	