

## (21) レタス・非結球レタス

## レタス

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
菌核病	シグナムWDG	ビラロストロビン・ホスカリド水和剤	11,7		1500倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	レタス
	スミレックス水和剤	プロキシムン水和剤	2		1000～2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	レタス
	トップジンM水和剤	チオファネートメチル水和剤	1		1500～2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	レタス
					1500倍	1.5g/m <sup>2</sup>	収穫45日前まで	灌注	1回	レタス
	ベンレート水和剤	ベンゾミル水和剤	1		2000～3000倍	100～300mL/m <sup>2</sup>	収穫14日前まで	散布	4回以内	レタス
					2000～3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	レタス
	ロブテール水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	レタス
黒腐病	コサイト3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類
すそ枯病	シグナムWDG	ビラロストロビン・ホスカリド水和剤	11,7		1500倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	レタス
	バリダシン液剤5	バリダマイシン液剤	U18		800倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	レタス
	フロンサイト粉剤	フルアジナム粉剤	29		30kg/10a		は種又は定植前	全面土壌混和	1回	レタス
軟腐病	コサイト3000	銅水和剤	M1		2000倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類
灰色かび病	スミレックス水和剤	プロキシムン水和剤	2		1000～2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	5回以内	レタス
	ロブテール水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000～1500倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	レタス
腐敗病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500～800倍	100～300g/10a	-	散布	-	レタス
べと病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内	レタス
材ハコガ	ベリマークSC	シアントラニプロール水和剤	28		400倍	セル成型育苗トレイ1箱またはベーパーポット1冊日 (約30×60cm、使用土壌約1.5～4g)当り 0.5g	育苗期後半～定植当	灌注	1回	レタス
ネリムシ類	カルス微粒剤F	イソキサチオン粉粒剤	1B	劇	6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散布土壌混和处理	2回以内	レタス
	カルス粉剤	イソキサチオン粉剤	1B		6kg/10a		は種時又は植付時	土壌表面散布土壌混和处理	2回以内	レタス
	ダアジン粒剤3	ダアジン粒剤	1B		6～9kg/10a		は種時又は植付時	土壌混和	2回以内	レタス
ハモンヨトウ	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	レタス
	ベリマークSC	シアントラニプロール水和剤	28		400倍	セル成型育苗トレイ1箱またはベーパーポット1冊日 (約30×60cm、使用土壌約1.5～4g)当り 0.5g	育苗期後半～定植当	灌注	1回	レタス
ヨトウムシ	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300g/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	レタス

## 非結球レタス

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
黒腐病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
軟腐病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500～1000倍	100～300g/10a	-	散布	-	野菜類(キャベツを除く)
腐敗病	Zボルト-	銅水和剤	M1		500～800倍	100～300g/10a	-	散布	-	非結球レタス
ネリムシ類	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン粒剤	1B			6kg/10a	は種時又は定植時	全面土壌混和又は作条土壌混和	2回以内	非結球レタス