

(28) さといも

RPA

| 病害虫名 | 薬剤名 | 農薬の種類 | RAC | 毒劇 | 使用濃度 | 使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 | 作物名 |
|-----------|--------------|--------------------|-----------|----|----------------|--------------|----------------|----------|------|-------------------|
| 疫病 | アミスター20フロアブル | アゾキストロピン水和剤 | 11 | | 2000倍 | 100～300g/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | さといも |
| | ジーフイン水和剤 | 炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 | M1,NC | | 1000倍 | 150～500g/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | さといも |
| | ダイトモ顆粒水和剤 | アミスプロロム・シメキシル水和剤 | 21,27 | | 2000倍 | 100～300g/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | さといも |
| | ランマンフロアブル | シアゾファミド水和剤 | 21 | | 2000倍 | 100～300g/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | さといも |
| | ベネット水和剤 | ベンチアザリカルブイソプロピル・マン | "UN(I*),4 | | 1000倍 | 100～300g/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | さといも |
| | カンパネラ水和剤 | ゼブ水和剤 | 0 | | | | | | | |
| 黒斑病 | ベンレートT水和剤20 | チウラム・ベノミル水和剤 | 1,M3 | | 20倍 | - | 植付前 | 1分間種いも浸漬 | 1回 | さといも |
| | | | | | 種いも重量の0.4～0.5% | - | 植付前 | 種いも粉衣 | 1回 | さといも |
| アブラムシ類 | アトマイヤー1粒剤 | イミダクロプリド粒剤 | 4A | | 4kg/10a | | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | さといも |
| | | | | | 4kg/10a | | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | さといも(葉柄) |
| | エルサン乳剤 | PAP乳剤 | 1B | 劇 | 1000～2000倍 | 100～300g/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | さといも |
| カンザワハダニ | ビラニカEW | テブフェビラト乳剤 | "21A(I*) | 劇 | 2000倍 | 150～300g/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | さといも |
| ハスモンヨトウ | エルサン乳剤 | PAP乳剤 | 1B | 劇 | 1000倍 | 100～300g/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | さといも |
| | エルサン粉剤2 | PAP粉剤 | 1B | | 3kg/10a | | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | さといも |
| | ゼンターリ顆粒水和剤 | BT水和剤 | 11A | | 1000倍 | 100～300L/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) |
| | トロン乳剤 | イトフェンプロックス乳剤 | 3A | | 1000倍 | 100～300g/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | さといも |
| | | | | | 1000倍 | 100～300g/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | さといも |
| | プレオフロアブル | ピリダリル水和剤 | UN | | 1000～2000倍 | 100～300g/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | さといも |
| | プレバソフロアブル5 | クロラントラニリプロール水和剤 | 28 | | 2000倍 | 100～300g/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | さといも |
| ハダニ類 | マイトコネフロアブル | ビフェナゼート水和剤 | 20D | | 1000倍 | 100～300g/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | さといも |
| ネグサレセンチュウ | ネマキック粒剤 | イミシアホス粒剤 | 1B | | 20kg/10a | | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | さといも |
| | ネマクリン粒剤 | フルビラム粒剤 | "[-](I*) | | 20kg/10a | | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | さといも |
| | ビラム粒剤 | フルビラム粒剤 | "[-](I*) | | 20kg/10a | | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | さといも |