

## (4) スターチス

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
うどんこ病	フルピカフロアブル	メパニピリム水和剤	9		2000倍	100～300g/10a	発病初期	散布	5回以内
	ボリベリン水和剤	イミノタジン酢酸塩・ボリオキシン水和剤	"[-](I*),M7		1000倍	100～300g/10a	発病初期	散布	8回以内
灰色かび病	フルピカフロアブル	メパニピリム水和剤	9		2000～3000倍	100～300g/10a	発病初期	散布	5回以内
	ボリベリン水和剤	イミノタジン酢酸塩・ボリオキシン水和剤	"[-](I*),M7		1000倍	100～300g/10a	発病初期	散布	8回以内
	ロブテール水和剤	イプロジオン水和剤	2		1000～1500倍	100～300g/10a	-	散布	8回以内
シロイモシヨトウ	カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	15		4000倍	100～300g/10a	発生初期	散布	3回以内
ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	フルフェノクスロン乳剤	15		2000倍	100～300g/10a	発生初期	散布	3回以内