

(2) ストック

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
萎凋病	ガスタート [®] 微粒剤	ダゾメット粉粒剤	"8F(I*)	劇	30~40kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	バースミド [®] 微粒剤	ダゾメット粉粒剤	"8F(I*)	劇	30~40kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
菌核病	ポリバ [®] リン水和剤	イミノクダジ [®] ン酢酸塩・ポリキサシ [®] ン水和剤	"[-] (I*),M7		1000倍	100~300 μ g/10a	発病初期	散布	8回以内
灰色かび病	ポリバ [®] リン水和剤	イミノクダジ [®] ン酢酸塩・ポリキサシ [®] ン水和剤	"[-] (I*),M7		1000倍	100~300 μ g/10a	発病初期	散布	8回以内
苗立枯病	トコロール	ケルビ [®] クリン燻蒸剤	8B	劇	<床土・堆肥>1穴当り 3~6mL<圃場>1穴 当り2~3mL			土壌くん蒸	2回以内(床土1 回以内、圃場1 回以内)
苗腐病	ガスタート [®] 微粒剤	ダゾメット粉粒剤	"8F(I*)	劇	20~30kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	バースミド [®] 微粒剤	ダゾメット粉粒剤	"8F(I*)	劇	20~30kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
コナガ	オンコル粒剤5	ペンフレカルブ [®] 粒剤	1A		0.5g/株 9kg/10a		定植時	株元散布	1回
	コテツフロアブル	クロルフェナピ [®] ル水和剤	13	劇	2000倍	150~300 μ g/10a	発生初期	散布	2回以内
	トアロー水和剤CT	BT水和剤	11A		1000倍	100~300 μ g/10a	発生初期	散布	-
	ノモルト乳剤	テフルベ [®] ンス [®] ロン乳剤	15		2000倍	100~300 μ g/10a	発生初期	散布	2回以内
	マブ [®] リック水和剤20	フルバ [®] リネート水和剤	3A	劇	2000倍	100~300 μ g/10a	発生初期	散布	2回以内
	ハイマダ [®] ラノマイカ [®]	モスピ [®] ラン粒剤	アセタミプリド [®] 粒剤	4A		0.5g/株		育苗期	株元散布