（2）ストック

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
萎凋病	ｶﾞｽﾀｰﾄﾞ微粒剤	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤	"8F(I*)	劇	30～40kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	ﾊﾞｽｱﾐﾄﾞ微粒剤	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤	"8F(I*)	劇	30～40kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
菌核病	ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*),M7		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	8回以内
灰色かび病	ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*),M7		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	8回以内
苗立枯病	ﾄﾞﾛｸﾛｰﾙ	ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ燻蒸剤	8B	劇	<床土･堆肥>1穴当り3～6mL<圃場>1穴当り2～3mL			土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内､圃場1回以内)
苗腐病	ｶﾞｽﾀｰﾄﾞ微粒剤	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤	"8F(I*)	劇	20～30kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
	ﾊﾞｽｱﾐﾄﾞ微粒剤	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤	"8F(I*)	劇	20～30kg/10a		は種又は植付前	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1回
ｺﾅｶﾞ	ｵﾝｺﾙ粒剤5	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤	1A		0.5g/株		定植時	株元散布	1回
					9kg/10a		定植時	全面土壌混和	1回
	ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤	13	劇	2000倍	150～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	2回以内
	ﾄｱﾛｰ水和剤CT	BT水和剤	11A		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	-
	ﾉｰﾓﾙﾄ乳剤	ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	2回以内
	ﾏﾌﾞﾘｯｸ水和剤20	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤	3A	劇	2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	2回以内
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤	4A		0.5g/株		育苗期	株元散布	1回

（3）トルコギキョウ

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
炭疽病	ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤	"UN(I*)		400倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	8回以内
ｱｻﾞﾐｳﾏ類	ﾏﾌﾞﾘｯｸ水和剤20	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤	3A	劇	4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	2回以内
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤	3A		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	6回以内

（4）スターチス

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
うどんこ病	ﾌﾙﾋﾟｶﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤	9		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	5回以内
	ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*),M7		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	8回以内
灰色かび病	ﾌﾙﾋﾟｶﾌﾛｱﾌﾞﾙ	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤	9		2000～3000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	5回以内
	ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤	"「-」(I*),M7		1000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発病初期	散布	8回以内
	ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤	2		1000～1500倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	-	散布	8回以内
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤	15		4000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	3回以内
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤	15		2000倍	100～300ﾘｯﾄﾙ/10a	発生初期	散布	3回以内