

## (2) 湛水直播栽培における防除

RPA

病害虫名	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
いもち病	ルーチンシード FS	P3		乾燥種もみ1kg当り原液6～12mL(原液71mL/10aまで)		は種前(浸種前)	塗沫処理(種子被覆剤を加用)	1回
				乾燥種もみ1kg当り原液6～12mL(原液71mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング 中又はコーティング 後の種もみに塗沫処理	1回
	Dr.オリゼ <sup>®</sup> フェルテラ粒剤	P2,2		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
紋枯病	エバ <sup>®</sup> -ゴ <sup>®</sup> ルシード FS	7		乾燥種もみ1kg当り原液10mL(原液44mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング 中又はコーティング 後の種もみに塗沫処理	1回
				乾燥種もみ1kg当り原液10mL(原液44mL/10aまで)		は種前(浸種前)	塗沫処理(種子被覆剤を加用)	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
苗腐病(ピシウム菌)	スクーデリアES	4		乾燥種もみ1kg当り原液5mL		は種前	種子吹き付け処理又は塗沫処理	1回
ウカ類	アド <sup>®</sup> マイヤー-水和剤	4A	劇	種もみ3kg当り150～200g(200g/10aまで)		は種前	過酸化カルシウム剤との同時湿粉衣	1回
ツマゲ <sup>®</sup> ロヨコハイ	アド <sup>®</sup> マイヤー-水和剤	4A	劇	種もみ3kg当り150～200g(200g/10aまで)		は種前	過酸化カルシウム剤との同時湿粉衣	1回
イネミスゾウムシ	ダントツプロア <sup>®</sup> ブル	4A		原液	種もみ3kg当り75mL/10a	は種前	塗沫処理	1回
	ヨ <sup>®</sup> -バルシード FS	28		乾燥種もみ1kg当り原液11mL(原液55mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング 中又はコーティング 後の種もみに塗沫処理	1回
	Dr.オリゼ <sup>®</sup> フェルテラ粒剤	P2,2		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回

病害虫名	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
イネミスゾウムシ	フォルテンザFS	28		乾燥種もみ1kg当り原液8mL		は種前	種子吹き付け処理又は塗沫処理	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
イネトモイムシ	ヨーロッパFS	28		乾燥種もみ1kg当り原液 11mL(原液55mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理	1回
	Dr.オレゼフェルテ粒剤	P2,2		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	フォルテンザFS	28		乾燥種もみ1kg当り原液8mL		は種前	種子吹き付け処理又は塗沫処理	1回
キリウジガガノボ	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
ニカメイトウ	ヨーロッパFS	28		乾燥種もみ1kg当り原液 11mL(原液55mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
アオビコヤカ	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回

病害虫名	薬剤名	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
イネトムシ	ヨーバルシード FS	28		乾燥種もみ1kg当り原液 11mL(原液55mL/10aまで)		は種前(浸種後)	コーティング中又はコーティング後の種もみに塗沫処理	1回
	箱いり娘粒剤	P3,4 A,5,7		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回
	箱王子粒剤	P3,4 A,5		1kg/10a		は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1回