

(25) とうもろこし

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数	作物名
アブラムシ類	アグロスリン乳剤	シペルメトリン乳剤	3A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	とうもろこし
	アデイオン乳剤	ペルメトリン乳剤	3A		3000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
アワメイガ	アグロスリン乳剤	シペルメトリン乳剤	3A	劇	1000～2000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	とうもろこし
	アデイオン乳剤	ペルメトリン乳剤	3A		2000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
	エルサン乳剤	PAP乳剤	1B	劇	1000倍	100～300g/10a	収穫14日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
	ベネビアOD	シアントラニプロール水和剤	28		2000～4000倍	100～300g/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	未成熟とうもろこし
アワヨトウ	トレボン乳剤	エトフェンプロックス乳剤	3A		1000倍	100～300g/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内	とうもろこし
ネキリムシ類	ガードベイトA	ペルメトリン粒剤	3A			3kg/10a	生育初期	株元散布	4回以内	とうもろこし