

(6) ユリ

RPA

病害虫名	薬剤名	農薬の種類	RAC	毒劇	使用濃度	使用量	使用時期	使用方法	使用回数
球根腐敗病	ホーマイ水和剤	チウラム・チオファネートメチル水和剤	1,M3		200倍		植付前又は貯蔵前	30分間球根浸漬	1回
					球根重量の1.0%		植付前又は貯蔵前	球根粉衣	1回
茎腐病	トップジンM水和剤	チオファネートメチル水和剤	1		1500～2000倍	100～300 μ g/10a	-	散布	5回以内
灰色かび病	アフェットフロアブル	ペンチオラド水和剤	7		2000倍	100～300 μ g/10a	発病初期	散布	3回以内
	フルビカフロアブル	メバニピリム水和剤	9		2000～3000倍	100～300 μ g/10a	発病初期	散布	5回以内
葉枯病	ダコニール1000	TPN水和剤	M5		1000倍	100～300 μ g/10a	-	散布	6回以内
	トップジンM水和剤	チオファネートメチル水和剤	1		1500～2000倍	100～300 μ g/10a	-	散布	5回以内
	フルビカフロアブル	メバニピリム水和剤	9		2000～3000倍	100～300 μ g/10a	発病初期	散布	5回以内
	フロキサド水和剤	フルアジナム水和剤	29		2000倍	100～300 μ g/10a	発病初期	散布	3回以内
	ポリオキシAL水溶剤	ポリオキシ水溶剤	"[-]" (I*)		2500倍	100～300 μ g/10a	発病初期	散布	8回以内
鱗茎さび症	フロキサド水和剤	フルアジナム水和剤	29		100～200倍	-	植付前	球根瞬間浸漬	1回
アブラムシ類	ウララ50DF	フロニカミド水和剤	29		10000倍	100～300 μ g/10a	発生初期	散布	6回以内
	トレボン乳剤	イトフェンプロックス乳剤	3A		2000倍	100～300 μ g/10a	-	散布	6回以内