



ウスヒラタケ 栽培マニュアル

ウスヒラタケの特徴

- ・ 秋～春の自然環境を活かした低コスト栽培向け
- ・ 香りが良くて、味にくせがなく、肉質はやわらかい
- ・ 福井県が開発したオリジナルきのこ

栽培管理 3つのポイント

①水の管理

菌床は、常に湿らせること。決して乾燥させないこと。
(手で触ってしっとりした感じが目安)

②温度の管理

発生温度は、日平均温度が16℃～20℃が最適。
(14℃以下、22℃以上で発生量が減少)

③明るさの管理

1000ルクス以下(雨の日の照度)に抑える。
(直射日光は絶対にさける)

栽培スケジュール

月	9			10			11			12			1			2			3		
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
スケジュール	伏せ込み			発生サイクル					約3週間(15~20日)											
				発生期間					10月~3月(10℃以下では発生しにくい)											


栽培の準備

車庫や小屋の中に棚を設置し
菌床を並べます。



栽培手順

- ①
菌床の側面にスリットを入れます。



- ②
乾燥しない様に、スリット部から
水が入るよう散水します。



- ③
傘径5～6cm、8分開きになった
頃収穫します。



- ④
収穫したウスヒラタケを、パック
に詰め出荷します。

防虫対策（キノコバエ）

成虫は施設周辺から飛来し、キノコに産卵、
幼虫はキノコひだ部に大量発生します。

粘着シートを設置してください。

また、出入り口や換気扇付近を明るくすることも有効です。



ウスヒラタケに関するお問い合わせは、最寄りの機関の林業普及指導員まで

農林水産部森づくり課	0776-20-0443
福井農林総合事務所 林業部	0776-21-8213
坂井農林総合事務所 林業部	0776-81-3223
奥越農林総合事務所 林業部	0779-65-1492
丹南農林総合事務所 林業部	0778-23-4961
嶺南振興局林業水産部	0770-56-2218
嶺南振興局二州農林部	0770-22-0291
総合グリーンセンター	0776-43-6503