



事務連絡
令和元年5月30日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の運用及び審査上の留意点について

ビタミン主薬製剤の製造販売に関する承認基準の運用及び審査上の留意点については、「ビタミン主薬製剤製造（輸入）承認基準及び浣腸薬製造（輸入）承認基準の運用及び審査上の留意点について」（昭和63年3月26日付け実務連絡）により示していますが、今般、「ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の一部改正について」（令和元年5月30日付け薬生発0530第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下、「基準」という。）が発出されたことを踏まえ、新たに別添のとおりまとめたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方御配慮願います。

ビタミン主薬製剤製造販売承認基準の運用及び審査上の留意点について

1 範囲について

ビタミンを主薬とした製剤であっても、滋養強壮等を目的としたビタミン含有保健剤等は、本基準の対象品目としない。

2 有効成分の種類について

- (1) 各主薬製剤に配合できる有効成分と成分数については、別紙1 配合ルール表を参照のこと。
- (2) X欄7項のカルシウム塩類を配合する場合、その成分数は問わない。
- (3) XI欄2項のニンジン及び3項のヨクイニンについては、エキスと末とを同時に配合することはできない。なお、XI欄4項のコウジン、5項のトウキ及び6項のボウイについては末で配合することはできない。

3 有効成分の分量について

- (1) 基準別表1のAに掲げる量は主薬の場合の分量であり、Bに掲げる量は佐薬の場合の分量である。

ただし、ビタミンC主薬製剤にX欄4項のL-システインを配合する場合、同成分の1日最大分量は240 mgとする。
- (2) ビタミンE類(Ⅲ欄)については主薬の場合の1回最大分量及び1回最小分量が、ビタミンB₁(Ⅳ欄)のチアミンの塩類並びにチアミンジスルフィド及びその塩類(Ⅳ欄1項)については、主薬の場合の1回最大及び1回最小分量、佐薬の場合の1回最大分量が、それぞれ定められているので注意すること。

なお、基準の2(2)のウにより、ビタミンA(Ⅰ欄)、ビタミンC類(Ⅷ欄)又はカルシウム塩類(X欄7項)をそれぞれ2種以上配合する場合、個々の成分の下限は問わない。
- (3) ビタミンB₁₂類(Ⅶ欄)の主薬製剤は認められていないが、基準別表1のAに掲げるビタミンB₁₂類の分量は、ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤に主薬として用いる場合の分量である。
- (4) Ⅶ欄2項のメコバラミンをビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤に主体として配合する場合、Ⅳ欄2項のフルスルチアミン塩酸塩の1日分量はフルスルチアミンとして100 mgに限る。

4 剤形について

- (1) チュアブル錠及び発泡錠はビタミンC主薬製剤、ゼリー状ドロップ剤はビタミンA主薬製剤又はビタミンAD主薬製剤のみに認められる。
- (2) チュアブル錠とは口中で咀嚼又は溶解させて服用するものをいい、日本薬局方（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第41条第1項の規定により定めるものをいう。以下同じ。）製剤総則の錠剤の項に準ずるものとする。なお、食品類似の形状とならないよう十分留意すること。
- (3) 発泡錠とは、用時水又は温湯中で発泡し、崩壊・溶解させて服用するものをいい、日本薬局方製剤総則の錠剤の項に準ずるものとする。なお、食品類似の形状とらないよう十分留意すること。
- (4) ゼリー状ドロップ剤とは、口中で咀嚼して服用するものをいい、日本薬局方製剤総則の錠剤の項に準ずるものとする。ただし製造方法については、別紙2を参考にして具体的に記載すること。なお、食品類似の形状とらないよう十分留意すること。
- (5) 経口服液剤には、油状のものも含まれる。

5 用法及び用量について

- (1) 1回服用量又は1日服用回数のいずれか一方を幅で記載しても差し支えない。ただし、いずれの服用量又はいずれの回数においても1日最大分量、1日最小分量、1回最大分量及び1回最小分量を満足する必要がある。
また、1回服用量を幅で記載する場合、その最大服用量を最小服用量で除して得た値が4を超えてはならない。
なお、1回服用量に制限のある成分を主薬とする製剤で、1日2回以上の用法をもつものは服用時期（服用間隔でも可）を明記すること。
具体的な記載方法については別紙3を参照のこと。
- (2) 基準別表1のⅦ欄2項のメコバラミンをビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤に主体として配合する場合、用法は1日3回服用するものに限る。
- (3) 基準の2（4）のウ及びエにおける錠剤には、チュアブル錠、発泡錠は含まれない。
また、剤形をチュアブル錠、発泡錠とする場合には、次の例を参考に具体的な服用方法を明記すること。
例 チュアブル錠：かむか、口中で溶かして服用する。
発泡錠：水に溶かして服用する。
ゼリー状ドロップ剤とする場合には、次の例を参考に具体的な服用方法を明記すること。

例 ゼリー状ドロップ剤：かんで服用する。

なお、剤形別の適用可能年齢については、別紙4を参照のこと。

- (4) 丸剤、錠剤（チュアブル錠・発泡錠を除く）、軟カプセル剤については、直径6mmを超えるものとそれ以下とで、服用対象年齢に差が設けられているが、ここでいう直径とは、長径と短径がある場合には長径を指すものとする。
- (5) ビタミンA主薬製剤、ビタミンD主薬製剤、又はビタミンAD主薬製剤の場合の年齢係数は、Ⅰ欄又はⅡ欄の成分については（ ）内の係数、その他の成分については（ ）外の係数を用いる。

6 効能又は効果について

- (1) 効能又は効果は基準のとおり記載すること。なお、（ ）書きについても必ず記載すること。
- (2) ビタミンA主薬製剤、ビタミンD主薬製剤及びビタミンAD主薬製剤以外の「ただし書き」については、補給効能以外の全てにかかるものである。
- (3) ビタミンE主薬製剤及びビタミンEC主薬製剤の効能又は効果として「過酸化脂質の増化防止」と標榜することは認められていないが、ビタミンEの作用として添付文書等に記載することは差し支えない。

7 経口液剤の包装単位等について

- (1) 1回1本を服用する形態のもの（いわゆるドリンク剤、アンプル剤）については、1本100 mL以下であること。
- (2) 分割服用する形態のものについては、最高年齢区分の最大用量の4日分以下の容量とし、1回服用量は20 mL以下であること。
ただし、日局肝油については承認前例を参考にして審査する。

8 対比表について

審査の迅速化を図るため、別紙5の例を参考として作成された対比表を申請書に添付すること。

別紙1

配合ルール表

| 成分 | | I 欄 | | II 欄 | III 欄 | | IV 欄 | | V 欄 | | VI 欄 | VII 欄 | | VIII 欄 | IX 欄 | | | X 欄 | | | | | | XI 欄 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|----|------|-------|----|------|----|-----|----|------|-------|----|--------|------|----|----|-----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | 1項 | 2項 | | 1項 | 2項 | 1項 | 2項 | 1項 | 2項 | | 1項 | 2項 | | 1項 | 2項 | 3項 | 1項 | 2項 | 3項 | 4項 | 5項 | 6項 | 7項 | 8項 | 9項 | 1項 | 2項 | 3項 | 4項 | 5項 | 6項 | | | | | | |
| 主薬製剤 | レチノール類 | ◎ | × | ○ | × | ○ | | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肝油類 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | | × | × | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビタミンD主薬製剤 | | ○ | × | ◎ | ○ | × | | × | × | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | ○ | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| ビタミンE主薬製剤 | | × | | × | ◎ | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | | | | | | × | ○ | × | ○ | | ○ | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンB ₁ 主薬製剤 | | × | | × | ○ | ◎ | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | | | | | | ○ | | × | ○ | | ○ | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンB ₂ 主薬製剤 | | × | | × | × | ○ | | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンB ₆ 主薬製剤 | | × | | × | ○ | ○ | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンC主薬製剤 | | × | | × | ○ | × | | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンAD主薬製剤 | | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | ○ | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| ビタミンB ₂ B ₆ 主薬製剤 | | × | | × | × | × | | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンEC主薬製剤 | | × | | × | ◎ | × | | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | ○ | × | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | | | | | | | | | |
| ビタミンB ₁ B ₆ B ₁₂ 主薬製剤 | ビタミンB ₁₂ 類 | × | | × | ○ | ◎ | | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | | | | | | | | | | |
| | メコバラミン | × | | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 成分数 | | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | | 1種 | 1種 | 1種 | 2種まで | 1種 | 1種 | 1種 | | 1種 | | 1種 | | | | 制限なし | 1種 | | | | | | | | | | | | | | | |

注1 成分名は参考

注2 ◎：必須、○：配合可、×：配合不可

別紙 2

ゼリー状ドロップ剤の製造方法

本剤を製するには、通例、次の方法による。

医薬品に乳化剤、乳化補助剤、懸濁化剤及び水を加え、適当な方法で乳化、懸濁又は溶解し、必要あればゲル化剤を加えて全質を均等にし、一定の形状に成形し、乾燥して製する。

本剤には、必要に応じて保存剤、安定剤、着色剤、矯味剤、芳香剤などを加えることができる。

本剤は、白糖又は適当なコーティング剤で剤皮を施すことができる。

用法・用量 記載例

| 1日服用回数 | 記 載 例 | |
|--------|--|--|
| | 1回量を固定した場合 | 1回量を幅で記載した場合 |
| 1回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1日1回〇〇を服用する。 ・1回〇〇、1日1回服用する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・1日1回〇〇～××を服用する。 ・1回〇〇～××、1日1回服用する。 |
| 2回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇、1日2回〔服用時期〕服用する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇～××、1日2回〔服用時期〕服用する。 |
| 3回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇、1日3回〔服用時期〕服用する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇～××、1日3回〔服用時期〕服用する。 |
| 1～2回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇、1日 〈 2回を限度として 1～2回 〉 服用する。 ただし、1日2回服用する場合は、〔服用時期〕服用する。 | |
| 1～3回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇、1日 〈 3回を限度として 1～3回 〉 服用する。 ただし、1日2回服用する場合は〔服用時期〕、1日3回服用する場合は〔服用時期〕服用する。 | |
| 2～3回 | <ul style="list-style-type: none"> ・1回〇〇、1日2～3回服用する。 ただし、1日2回服用する場合は〔服用時期〕、1日3回服用する場合は〔服用時期〕服用する。 | |

注) ①年齢区分の記載は省略してある。

② 〈 〉内はいずれか一方を選択する。

③ []部分は適切な服用時期(例、朝夕、朝昼晩)を記載する。なお、服用時期の記載に替えて、服用間隔を記載しても差し支えない。(Ⅲ欄又はⅣ欄1項の有効成分を主薬として含有する製剤およびⅣ欄1項の有効成分を佐薬として含有する製剤に記載すること。)

④チュアブル錠、発泡錠、ゼリー状ドロップ剤にあつては、具体的な服用方法を併記すること。

別紙4

剤形別適用可能年齢表

| 年 齢 | 剤 形 | 顆 粒 剤 散 剤 経 口 液 剤 チュアブル錠・発泡錠 ゼリー状ドロップ剤 | 丸 錠 剤 (チュアブル錠・発泡錠を除く) 軟 カ プ セ ル 剤 | | 硬 カ プ セ ル 剤 |
|------------|-----|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | 直径6mm以下 | 直径6mmを 超えるもの | |
| 5歳以上 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3歳以上 5歳未満 | | ○ | ○ | × | × |
| 3か月以上 3歳未満 | | ○ | × | × | × |
| 3か月未満 | | × | × | × | × |

対比表記載例

1 全般例

(1) 一般的な例 (その 1)

ビタミンB₁主薬製剤 (硬カプセル剤)
 用法・用量 : 15 歳以上 1 回 2 カプセル } 1 日 2 回
 7 歳以上 15 歳未満 1 回 1 カプセル }

| 欄 | 項 | 主 ／ 佐 <small>(注)</small> | 有効成分名 | 7 歳以上 15 歳未満の 1 日分量 | | | | | | 備考 |
|----|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|----|
| | | | | 15 歳以上の 1 日分量 | | 11 歳以上 15 歳未満 の 1 日分量 | | 7 歳以上 11 歳未満 の 1 日分量 | | |
| | | | | 基準量 | 4 カプセル中 | 基準量 | 2 カプセル中 | 基準量 | 2 カプセル中 | |
| IV | 2 | ◎ | オクトチアミン | 100 mg ∩ 5 mg | 100 mg | 66.7 mg ∩ 3.33 mg | 50 mg | 50 mg ∩ 2.5 mg | 50 mg | |
| V | 1 | ○ | リボフラビン | 12 mg ∩ 2 mg | 10 mg | 8 mg ∩ 1.33 mg | 5 mg | 6 mg ∩ 1 mg | 5mg | |
| X | 9 | ○ | コンドロイチン硫酸エ ステルナトリウム | 900 mg ∩ 180 mg | 250 mg | 600 mg ∩ 120 mg | 125 mg | 450 mg ∩ 90 mg | 125 mg | |

注) ◎ : 主薬、○ : 佐薬

(2) 一般的な例 (その2)

| | | |
|--|-------------|------------|
| ビタミンB ₂ B ₆ 主薬製剤 (シロップ剤) | | |
| 用法・用量: | 15歳以上 | 1回 10.0 mL |
| | 11歳以上 15歳未満 | 1回 6.5 mL |
| | 7歳以上 11歳未満 | 1回 5.0 mL |
| | 3歳以上 7歳未満 | 1回 3.0 mL |
| | 1歳以上 3歳未満 | 1回 2.5 mL |
| | 6か月以上 1歳未満 | 1回 2.0 mL |
| | 3か月以上 6か月未満 | 1回 1.5 mL |

} 1日3回

| 欄 | 項 | 主 / 佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | 7歳以上11歳未満の1日分量 | | 3歳以上7歳未満の1日分量 | | 1歳以上3歳未満の1日分量 | | 6か月以上1歳未満の1日分量 | | 3か月以上6か月未満の1日分量 | | 備考 |
|----|---|----------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------|---------|-----------------|-------|----------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|-------|----------------------|--------|---|
| | | | | 基準量 | 30mL中 | 基準量 | 19.5mL中 | 基準量 | 15mL中 | 基準量 | 9mL中 | 基準量 | 7.5mL中 | 基準量 | 6mL中 | 基準量 | 4.5mL中 | |
| V | 1 | ◎ | リボフラビンリン酸エステルナトリウム (リボフラビンとして) | 30 mg } 2 mg | 30 mg | 20 mg } 1.33 mg | 19.5 mg | 15 mg } 1 mg | 15 mg | 10 mg } 0.67 mg | 9 mg | 7.5 mg } 0.5 mg | 7.5 mg | 6.0 mg } 0.4 mg | 6 mg | 5 mg } 0.33 mg | 4.5 mg | 30 mL中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム 38.13mg |
| VI | | ◎ | ピリドキシン塩酸塩 | 100 mg } 10 mg | 100 mg | 66.7 mg } 6.67 mg | 65 mg | 50 mg } 5 mg | 50 mg | 33.3 mg } 3.33 mg | 30 mg | 25 mg } 2.5 mg | 25 mg | 20 mg } 2 mg | 20 mg | 16.7 mg } 1.67 mg | 15 mg | |
| XI | 3 | ○ | ヨクイニンエキス (原生薬換算量) | 10 g } 1 g | 5 g | 6.67 g } 0.67 g | 3.25 g | 5 g } 0.5 g | 2.5 g | 3.33 g } 0.33 g | 1.5 g | 2.5 g } 0.25g | 1.25 g | 2.0 g } 0.2 g | 1 g | 1.67 g } 0.17 g | 0.75 g | 30 mL中 ヨクイニンエキス ××mg |

(3) 服用回数に幅のある例 (1回服用量に幅のある場合もこれに準ずる)

| | | |
|---|------|----------|
| ビタミンB ₁ B ₆ B ₁₂ 主薬製剤 (錠剤) | | |
| 用法・用量：15歳以上 | 1回3錠 | } 1日1～3回 |
| 11歳以上15歳未満 | 1回2錠 | |
| 5歳以上11歳未満 | 1回1錠 | |

5歳以上11歳未満の1日分量

| 欄 | 項 | 主/佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | | 7歳以上11歳未満の1日分量 | | | 5歳以上7歳未満の1日分量 | | | 備考 |
|-----|---|-----|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | 基準量 | 最大9錠中 | 最小3錠中 | 基準量 | 最大6錠中 | 最小2錠中 | 基準量 | 最大3錠中 | 最小1錠中 | 基準量 | 最大3錠中 | 最小1錠中 | |
| IV | 2 | ◎ | ビスベンチアミン (チアミン塩化物塩酸塩換算量) | 100 mg } 5 mg | 90 mg | 30 mg | 66.7 mg } 3.33 mg | 60 mg | 20 mg | 50 mg } 2.5 mg | 30 mg | 10 mg | 33.3 mg } 1.67 mg | 30 mg | 10 mg | 9錠中 ビスベン チアミン 102.86 mg |
| VI | | ◎ | ピリドキシン塩酸塩 | 100 mg } 10 mg | 90 mg | 30 mg | 66.7 mg } 6.67 mg | 60 mg | 20 mg | 50 mg } 5 mg | 30 mg | 10mg | 33.3 mg } 3.33 mg | 30 mg | 10 mg | |
| VII | 1 | ◎ | シアノコバラミン | 1500 µg } 60 µg | 900 µg | 300 µg | 1000 µg } 40 µg | 600 µg | 200 µg | 750 µg } 30 µg | 300 µg | 100 µg | 500 µg } 20 µg | 300 µg | 100 µg | |

(4) 1回量に制限のある成分を配合した例

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| ビタミンE主薬製剤 (分包顆粒剤) | | |
| 用法・用量：15歳以上 | 1回1包 | } 1日2回 |
| 11歳以上15歳未満 | 1回2/3包 | |
| 7歳以上11歳未満 | 1回1/2包 | |
| 3歳以上7歳未満 | 1回1/3包 | |
| 1歳以上3歳未満 | 1回1/4包 | |

| 欄 | 項 | 主 / 佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | 7歳以上11歳未満の1日分量 | | 3歳以上7歳未満の1日分量 | | 1歳以上3歳未満の1日分量 | | 備考 |
|-----|---|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----|
| | | | | 基準量 | 2包中 | 基準量 | 4/3包中 | 基準量 | 1包中 | 基準量 | 2/3包中 | 基準量 | 1/2包中 | |
| III | | ◎ | トコフェロール酢酸エステル | 300 mg } 100 mg (100~50 mg) | 100 mg (50 mg) | 200 mg } 66.7 mg (66.7~33.3 mg) | 66.7 mg (33.3 mg) | 150 mg } 50 mg (50~25 mg) | 50 mg (25 mg) | 100 mg } 33.3 mg (33.3~16.7 mg) | 33.3 mg (16.7 mg) | 75 mg } 25 mg (25~12.5 mg) | 25 mg (12.5 mg) | |
| IV | 1 | ○ | チアミン硝酸化物 | 25 mg } 1 mg (10 mg 以下) | 20 mg (10 mg) | 16.7 mg } 0.67 mg (6.67 mg 以下) | 13.3 mg (6.67 mg) | 12.5 mg } 0.5 mg (5 mg 以下) | 10 mg (5 mg) | 8.33 mg } 0.33 mg (3.33 mg 以下) | 6.67 mg (3.33 mg) | 6.25 mg } 0.25 mg (2.5 mg 以下) | 5 mg (2.5 mg) | |
| X | 2 | ○ | イノシトールヘキサニコチン酸エステル | 400 mg } 80 mg | 200 mg | 266.7 mg } 53.3 mg | 133.3 mg | 200 mg } 40 mg | 100 mg | 133.3 mg } 26.7 mg | 66.7 mg | 100 mg } 20 mg | 50 mg | |

(5) 比例計算例

ビタミンC主薬製剤（発泡錠：割線入）
 用法・用量：15歳以上 1回1錠
 1歳以上15歳未満 1回1/2錠 } 1日3回

| 欄 | 項 | 主 / 佐 | 有効成分名 | 1歳以上15歳未満の1日の分量 | | | | | | | | | | 備考 |
|------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 15歳以上の1日分量 | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | 7歳以上11歳未満の1日分量 | | 3歳以上7歳未満の1日分量 | | 1歳以上3歳未満の1日分量 | | |
| | | | | 基準量 | 3錠中 | 基準量 | 3/2錠中 | 基準量 | 3/2錠中 | 基準量 | 3/2錠中 | 基準量 | 3/2錠中 | |
| VIII | | ◎ | アスコルビン酸 | 2000 mg } | 500 mg | 1333.3 mg } | 250 mg | 1000 mg } | 250 mg | 666.7 mg } | 250 mg | 500 mg } | 250 mg | |
| | | | アスコルビン酸 ナトリウム (アスコルビン 酸として) | | 500 mg | | 250 mg | | 250 mg | | 250 mg | | 250 mg | 3錠中 アスコルビン 酸ナトリウム ××mg |
| | | | 合計量 (アスコルビン 酸として) | 2000 mg } 50 mg | 1000 mg | 1333.3 mg } 33.3 mg | 500 mg | 1000 mg } 25 mg | 500 mg | 666.7 mg } 16.7 mg | 500 mg | 500 mg } 12.5 mg | 500 mg | |

(6) 上記(3)～(5)の複合例(その1)

| | | | | |
|----------------|------|--|--|----------|
| ビタミンEC主薬製剤(錠剤) | | | | } 1日2～3回 |
| 用法・用量：11歳以上 | 1回2錠 | | | |
| 5歳以上11歳未満 | 1回1錠 | | | |

| 欄 | 項 | 主 / 佐 | 有効成分名 | 11歳以上の1日分量 | | | | | | 5歳以上11歳未満の1日分量 | | | | | | 備考 |
|------|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|----|
| | | | | 15歳以上の1日分量 | | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | | 7歳以上11歳未満の1日分量 | | | 5歳以上7歳未満の1日分量 | | | |
| | | | | 基準量 | 最大 6錠中 | 最小 4錠中 | 基準量 | 最大 6錠中 | 最小 4錠中 | 基準量 | 最大 3錠中 | 最小 2錠中 | 基準量 | 最大 3錠中 | 最小 2錠中 | |
| III | | ◎ | トコフェロール コハク酸エステル カルシウム (コハク酸d1- α-トコフェロ ールとして) | 300 mg } 100 mg (100~50 mg) | 150 mg 100 mg (50 mg) | 200 mg } 66.7 mg (66.7~33.3mg) | 150 mg 100 mg (50 mg) | 150 mg } 50 mg (50~25 mg) | 75 mg 50 mg (25mg) | 100 mg } 33.3 mg (33.3~16.7mg) | 75mg 50 mg (25 mg) | 6錠中 トコフェロー ルコハク酸エ ステルカルシ ウム ××mg | | | | |
| VIII | | ◎ | アスコルビン酸 | 2000 mg } | 150 mg 100 mg | 1333.3 mg } | 150 mg 100 mg | 1000 mg } | 75 mg 50 mg | 666.7 mg } | 75 mg 50 mg | | | | | |
| | | | アスコルビン酸 ナトリウム (アスコルビン 酸として) | | 150 mg 100 mg | | 150 mg 100 mg | | 75 mg 50 mg | | 75 mg 50 mg | 6錠中 アスコルビン 酸ナトリウム ××mg | | | | |
| | | | 合計量 (アスコルビン 酸として) | 2000 mg } 50 mg | 300 mg 200 mg | 1333.3 mg } 33.3 mg | 300 mg 200 mg | 1000 mg } 25 mg | 150 mg 100 mg | 666.7 mg } 16.7 mg | 150 mg 100 mg | | | | | |

() 内は1回分量

(7) 上記 (3) ~ (5) の複合例 (その2)

| | | | |
|---|------------------|---|------|
| ビタミンE C主薬製剤 (錠剤) 用法・用量：15歳以上 11歳以上15歳未満 | 1回2~3錠 1回1~2錠 | } | 1日3回 |
|---|------------------|---|------|

| 欄 | 項 | 主 / 佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | | 11歳以上15歳未満の1日分量 | | | 備考 |
|------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | 基準量 | 最大9錠中 | 最小6錠中 | 基準量 | 最大6錠中 | 最小3錠中 | |
| III | | ◎ | トコフェロール酢酸エステル | 300 mg } 100 mg (100~50 mg) | 300 mg (100 mg) | 200 mg (66.7 mg) | 200 mg } 66.7 mg (66.7~33.3 mg) | 200 mg (66.7 mg) | 100 mg (33.3 mg) | |
| VIII | | ◎ | アスコルビン酸 | 2000 mg } | 120 mg | 80 mg | 1333.3 mg } | 80mg | 40 mg | |
| | | | アスコルビン酸カルシウム (アスコルビン酸として) | | 120 mg | 80 mg | | 80 mg | 40 mg | 9錠中 アスコルビン酸 カルシウム ××mg |
| | | | 合計量 (アスコルビン酸として) | 2000 mg } 50 mg | 240 mg | 160 mg | 1333.3 mg } 33.3 mg | 160 mg | 80 mg | |

() 内は1回分量

2 ビタミンA/D主薬製剤

(1) 肝油主体にレチノールを配合した例

| | | |
|--------------|------|--------|
| 剤形：ゼリー状ドロップ剤 | | |
| 用法・用量：15歳以上 | 1回3個 | } 1日3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 1回2個 | |
| 3か月以上7歳未満 | 1回1個 | |

| 欄 | 項 | 主 ／ 佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | 7歳以上15歳未満の1日分量 | | 3か月以上7歳未満の1日分量 | | 備考 |
|---|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 基準量 | 9個中 | 基準量 | 6個中 | 基準量 | 3個中 | |
| I | 1 | ○ | レチノール酢酸エステル (ビタミンAとして) | 2000 I.U. } | 900 I.U. | 1333.3 I.U. } | 600 I.U. | 1000 I.U. } | 300 I.U. | 9個中 レチノール酢酸 エステル ××mg |
| | 2 | ◎ | 肝油 (ビタミンAとして) | 4000 I.U. } | 3000 I.U. | 2666.7 I.U. } | 2000 I.U. | 2000 I.U. } | 1000 I.U. | 9個中 肝油 ××mg |
| | 合計量 (ビタミンAとして) | | | 4000 I.U. } 2000 I.U. | 3900 I.U. | 2666.7 I.U. } 1333.3 I.U. | 2600 I.U. | 2000 I.U. } 1000 I.U. | 1300 I.U. | |

(2) 小児係数の異なる成分を配合した例

| | | |
|-------------|--------|----------|
| 剤形：錠剤（割線入） | | |
| 用法・用量：15歳以上 | 1回3錠 | } 1日2～3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 1回2錠 | |
| 5歳以上7歳未満 | 1回1.5錠 | |

| 欄 | 項 | 主／佐 | 有効成分名 | 15歳以上の1日分量 | | | 7歳以上15歳未満の1日分量 | | | | 5歳以上7歳未満の1日分量 | | | 備考 |
|----|---|-----|---|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| | | | | 基準量 | 最大 9錠中 | 最小 6錠中 | 基準量 | | 最大 6錠中 | 最小 4錠中 | 基準量 | 最大 4.5錠中 | 最小 3錠中 | |
| | | | | | | | 11歳以上 15歳未満 | 7歳以上 11歳未満 | | | | | | |
| I | 1 | ◎ | レチノールパ ルミチン酸エ ステル (ビタミンAと して) | 4000 I. U. } 2000 I. U. | 4000 I. U. | 2666.7 I. U. | 2666.7 I. U. } 1333.3 I. U. | 2666.7 I. U. | 1777.8 I. U. | 2000 I. U. } 1000 I. U. | 2000 I. U. | 1333.3 I. U. | 9錠中 レチノール パルミチン 酸エステル ××mg | |
| II | | ◎ | コレカルシフ ェロール (ビタミンDと して) | 400 I. U. } 200 I. U. | 400 I. U. | 266.7 I. U. | 266.7 I. U. } 133.3 I. U. | 266.7 I. U. | 177.8 I. U. | 200 I. U. } 100 I. U. | 200 I. U. | 133.3 I. U. | 9錠中 コレカルシ フェロール ××mg | |
| X | 7 | ○ | グルコン酸カ ルシウム水和 物 (カルシウムと して) | 300 mg } 30 mg | 100 mg | 66.7 mg | 200 mg } 20 mg | 150 mg } 15 mg | 66.7 mg | 44.4 mg | 100 mg } 10 mg | 50 mg | 33.3 mg | 9錠中 グルコン酸 カルシウム 水和物 ××mg |

3 ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤

(1) IV欄, VI欄及びVII欄2項を主体とした製剤の例

〔 剤形：錠剤
用法・用量：15歳以上 1回1錠 1日3回 〕

| 欄 | 項 | 主 ／ 佐 | 有効成分名 | 基準量 | 3錠中 | 備考 |
|-----|---|-------------|------------------------------|----------------------|---------|----------------------------|
| IV | 2 | ◎ | フルスルチアミン塩酸塩 (フルスルチアミンとして) | 100 mg | 100 mg | 3錠中 フルスルチアミン塩酸塩 ××mg |
| VI | | ◎ | ピリドキシン塩酸塩 | 100 mg ∟ 10 mg | 100 mg | |
| VII | 2 | ◎ | メコバラミン | 1500 µg | 1500 µg | |
| III | | ○ | 酢酸 d-α-トコフェロール | 100 mg ∟ 10 mg | 100 mg | |