

韓国で口蹄疫が発生!



今一度、発生予防を徹底しましょう!

韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況 (2025年3月14日時点)



豚農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします!

□ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者以外の立入を制限しましょう。
□ 農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。



チェック!

- 畜舎の出入り時は、専用の靴・衣服※を着用し、手指を消毒するとともに、飼養管理で使用する物品は定期的に消毒しましょう。
 ※ 大臣指定地域に限る。
- □ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、 疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。

専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう!

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や 衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒 を実施しましょう。 ※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

靴や衣服が汚れた時には、洗浄・消毒しましょう。 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、 まずは汚れを落としてから消毒しましょう。 また、消毒液が汚れていたら、直ちに交換しましょ



推奨される踏込消毒槽の設置方法 ②消毒液の槽

①水洗の槽



農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤの みを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消 毒し、衛生管理区域内で降車する場合に農場専用の フロアマット等の使用や車内(ハンドルやドアノブ 等)の消毒を実施しましょう。



車両はタイヤだけでなく、<mark>泥よけの内側</mark>まで 消毒し、フロアマットの交換やペダル等車内も

≪要注意≫

- 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です!
- 消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと! \bigstar

疑わしい症状は直ちに通報を!

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを 流したり、**ロ、ひづめ、乳房に水疱(水ぶくれ)**ができるのが特徴です。

~豚の症状~





<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

接種3日目

写真:動物衛生研究部門提供 接種4日目

多数の水疱病変を確認



毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの 家畜保健衛生所に連絡しましょう。

連絡先: 福井県家畜保健衛生所

0776-54-5104