


# 新型コロナワクチン お子さまの接種をご検討ください

## 乳幼児のワクチン接種が始まりました

### ○乳幼児のワクチン接種とは？

- ・生後6か月から4歳のお子様を対象です。
- ・6か月～4歳用のワクチン(ファイザー社)を3回接種します(右図参照)



### ○ワクチン接種の効果は？ 副反応はどうなる？

【効果】3回目の接種から7日目以降の発症予防効果は73.2%と報告されています。

【副反応】ほとんどの症状が軽度または中程度と報告されています。

症状(発現割合:1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後)			
生後6か月～1歳で主にみられる症状		2歳～4歳で主にみられる症状	
機嫌が悪い	51.2% → 47.4% → 43.6%	疼痛	30.8% → 31.0% → 26.7%
食欲減退	22.2% → 22.2% → 20.2%	疲労	29.7% → 25.7% → 24.5%
発熱	7.2% → 7.4% → 6.8%	発熱	5.2% → 4.9% → 5.1%
注射部位の腫れ	3.9% → 3.9% → 2.7%	注射部位の腫れ	3.7% → 5.7% → 3.1%

日本小児科学会も、効果と安全性が確認されているワクチンの接種を推奨しています。

厚生労働省  
リーフレット



厚生労働省  
Q&A



## 5歳～11歳のお子様への接種(小児接種)も引き続き実施しております

お住まいの市町の広報やホームページで、接種のスケジュール等をご確認ください。

医学的な相談はこちら  
(またはかかりつけ医にご相談を)

☎0776-20-2210  
新型コロナワクチン接種相談センター  
(24時間、土日祝日も対応)

ワクチン接種は強制ではありません。

接種を受けられるかどうかは、効果と副反応のリスクの両方をご理解のうえ、保護者の方の意思に基づいてご判断ください。周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な対応をすることがないようにお願いします。

副反応についてはこちら

5～11歳



生後6か月～4歳

