

各関係機関の長 様

福井県農業試験場長
(公印省略)

農作物病虫害発生予察予報の送付について

このことについて、下記のとおり発表しましたので送付します。

連絡先 福井県農業試験場 病虫害防除室 Tel 0776-54-5100(代表) 0776-54-9315(直通) FAX 0776-54-6403 E-mail byogaichu-boujo@fklab.fukui.fukui.jp

平成27年農作物病虫害発生予察予報第7号

9月の気象概況

天気は数日の周期で変わらるでしょう。気温は高い確率40%、降水量は少ない確率40%です。

[水稲関係]

病虫害名 ツマグロヨコバイ

- 1 予報内容
発生時期：加害最盛期は9月上旬頃
被害程度：少発
発生量：平年、前年より少ない
- 2 防除対策および防除上の注意点
(1) 8月中旬の発生量は少ないので防除の必要はない。

[オオムギ関係]

病虫害名 裸黒穂病（種子消毒）

- 1 予報内容
発生量：平年より少なく、前年並み
- 2 防除対策および防除上の注意点
(1) 種子伝染するので、種子を更新し健全な種子を使用する。また、塩水選（比重1.13）により不良麦を除去する。塩水選終了後は塩水を落とすために水で十分に種子を洗い、むしろなどの上に広げて陰干しする。
(2) 薬剤消毒や風呂湯浸法（湯の温度を42℃にし、10時間浸漬する。浸漬中は1時間当たり1.5℃程度温度を下げるようにする。種子は積み重ねず、浸漬直後とその後時々攪拌する）により種子消毒を徹底する。

病害虫名 雲形病（種子消毒）

1 予報内容

発生量：平年より少なく、前年並み

2 防除対策および防除上の注意点

- (1) 種子伝染するので、種子を更新し健全な種子を使用する。また、塩水選（比重 1.13）により不良麦を除去する。塩水選終了後は塩水を落とすために水で十分に種子を洗い、むしろなどの上に広げて陰干しする。
- (2) 薬剤消毒や風呂湯浸法（湯の温度を 42℃にし、10 時間浸漬する。浸漬中は 1 時間当たり 1.5℃程度温度を下げるようにする。種子は積み重ねず、浸漬直後とその後時々攪拌する）により種子消毒を徹底する。
- (3) 種子が覆土されると発病が少なくなるので、条播を励行する。
- (4) 早播きすると発生が多くなるので、適期播種に努める。

[ダイズ関係]

病害虫名 ハスモンヨトウ

1 予報内容

発生時期：幼虫加害最盛期は 9 月中旬頃

被害程度：少発、局中発

発生量：平年よりやや多く、前年並み

2 防除対策および防除上の注意点

- (1) 白変葉や分散前の若齢幼虫がみられたら、直ちに防除を行う。

病害虫名 カメムシ類

1 予報内容

発生時期：加害最盛期は 9 月中旬

被害程度：少発、局中発

発生量：平年よりやや多く、前年並み

2 防除対策および防除上の注意点

- (1) 圃場への侵入が多くなる子実肥大終期（9 月中旬頃）に防除を行う。
- (2) 9 月中旬の加害最盛期に、1 圃場あたり 100 株ずつ 3 カ所の見とり調査を行い、カメムシ類が平均して 100 株当たり 4.0 頭以上いる場合は防除を行う。
- (3) ホソヘリカメムシが優占種である場合は、加害能力が高いので注意する。
- (4) 薬剤は莢に十分付着するように散布する。

病害虫名 フタスジヒメハムシ

1 予報内容

発生時期：第 3 世代成虫発生最盛期は 9 月中旬頃

被害程度：少発

発生量：平年より少なく、前年並み

2 防除対策および防除上の注意点

- (1) 8 月下旬に第 2 世代成虫の防除を行っていない圃場は、9 月上旬までに防除を行う。
- (2) 薬剤は莢に十分付着するように散布する。

[野菜関係]

野菜名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
キャベツ ハクサイ	べと病	初発期： 10月中旬	少発	平年：少 前年：やや多	1)排水をよくする。 2)密植を避ける。 3)肥料切れをさせない。 4)被害葉を除去する。 5)薬剤は葉の裏側にもよく散布する。
ハクサイ	白斑病	初発期： 10月上旬	少発	平年：少 前年：多	1)酸性土壌を矯正する。 2)排水を良くする。 3)肥料切れをさせない。
ダイコン ハクサイ キャベツ	軟腐病	初発期： 10月上旬	少発	平年：並み 前年：やや多	1)連作を避ける。 2)高温年は播種時期を遅らせる。 3)排水をよくする。 4)間引き作業は適期に行う。 5)食痕性害虫を防除する。 6)幼苗期の防除は薬害に注意する。
	モザイク病	初発期： 9月下旬	少発	平年：並み 前年：多	1)アブラムシを防除する。 2)発病株は早めに除去し、処分する。
ニンジン	黒葉枯病		少発	平年：並み 前年：多	1)連作を避ける。 2)排水を良くする。 3)肥料切れをさせない。
ネギ	さび病		少発	平年：多 前年：やや少	1)肥料不足や窒素過多にならないようにする。
全般	アブラムシ類		少発 (局中発)	平年：並み 前年：並み	1)対象作物により薬剤が異なるので注意する。
	ハダニ類		少発 (局中発)	平年：多 前年：多	
	ヨトウムシ類 (ヨトウガ、シロシタヨトウなど)	幼虫発生 初期： 9月上旬	少発	平年：多 前年：多	
	ハスモンヨトウ	幼虫加害 盛期： 9月中旬	少発 (局多発)	平年：多 前年：多	

野菜名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
アブラナ 科野菜	コナガ		少発 (局中発)	平年：並み 前年：並み	1) 対象作物により薬剤が異なる ので注意する。
	モンシロチ ョウ (アオ ムシ)		少発 (局中発)	平年：多 前年：多	
	タマナギン ウワバ	加害盛期： 9月中旬	少発	平年：多 前年：多	
	キスジノミ ハムシ	加害盛期： 9月中旬	少発 (局中発)	平年：多 前年：多	
	ハイマダラ ノメイガ	加害盛期： 9月上旬	少発 (局中発)	平年：多 前年：多	1) 薬剤は新芽にかかるように散 布する。
ナス ピーマン キュウリ サヤイン ゲン ホウレン ソウ	ミナミキイ ロアザミウ マ		少発 (局多発)	平年：多 前年：多	1) 寄主範囲が広いので注意する。
トマト キュウリ	タバココナ ジラミ		少発 (局中発)	平年：多 前年：多	
トマト ナス ピーマン	オオタバコ ガ		少発	平年：多 前年：多	1) 果実に食入するため若齢期に 防除を徹底する。
トマト	ミカンキイ ロアザミウ マ		少発 (局多発)	平年：多 前年：多	

[果樹関係]

果樹名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
ナ シ	ハダニ類		少発 (局中発)	平年：やや多 前年：やや多	1) 同一系統の薬剤の連用を避け る。

[花き関係]

花き名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
キ ク	白さび病		少発	平年：少 前年：並み	1) 罹病株が周辺への伝染源となるので、抜き取り処分する。 2) 下葉を除去し、日当たり、風通しを良くする。 3) 同一系統薬剤の連用を避ける。
	アブラムシ類		少発	平年：やや多 前年：やや多	1) 同一系統薬剤の連用を避ける。
	オオタバコガ		少発	平年：並み 前年：並み	1) 若齢幼虫期までに防除を徹底する。 2) 同一系統薬剤の散布回数を減らし、連用を避ける。
	ハダニ類		少発 (局中発)	平年：多 前年：やや多	1) 同一系統薬剤の散布回数を減らし、連用を避ける。