

稲作情報 No.26

そば適期収穫、麦の排水対策、早期秋起し

水田農業レベルアップ委員会 技術普及推進部会 [作成:福井県農業試験場、福井米戦略課、JA福井県中央会]

【そば】 気温の低下とともに、結実が進んできています。脱粒による収穫ロスを軽減するため、**黒化率70～80%**を目安にコンバインで収穫するようにしましょう。

そば圃場内に**帰化アサガオ**がある場合は、収穫までに除去しましょう。

【麦】 明渠が崩れているところは、降雨時に滞水しないように、**溝の手直し**をしましょう。

【水稻収穫後】 **早期に秋起し**をしましょう（早期秋起こしの効果はNo24参照）

〔そば〕



黒化率50～60%

県内のそば圃場および黒化率の一例 (10/31時点)

※地域や播種時期によって変わるので、必ず自分の圃場を確認する

〔帰化アサガオ〕



県内で代表的な帰化アサガオ(マルバルコウ)

〔麦〕



明渠が崩れているため、滞水している圃場(10/31時点)



そばに混入すると、
選別が非常に困難な
マルバルコウの種子

詳しい帰化アサガオの生態や、畦畔の対策は
「畦畔の帰化アサガオ類対応マニュアル」を参照。

福井県 帰化アサガオ マニュアル

検索