

農試第 1 2 5 - 9 号
平成 2 9 年 1 0 月 2 日

各関係機関の長 様

福井県農業試験場長
(公印省略)

農作物病害虫発生予察予報の送付について

このことについて、下記のとおり発表しましたので送付します。

連絡先 福井県農業試験場 病害虫防除室 Tel 0776-54-5100(代表) 0776-54-9315(直通) FAX 0776-54-6403 E-mail byogaichu-boujo@fklab.fukui.fukui.jp

平成 2 9 年農作物病害虫発生予察予報第 8 号

10 月の気象概況

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。気温は、平年並または低い確率ともに 4 0 % です。降水量は、平年並または少ない確率ともに 4 0 % です。

[野菜関係]

野菜名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
キャベツ ハクサイ	べと病	最盛期： 11 月下旬	少発	平年：並み 前年：並み	1) 被害葉を除去する。 2) 薬剤散布の際は、葉の裏側にもよくかかるようにする。 3) 肥料切れをさせない。
ハクサイ	白斑病	最盛期： 11 月下旬	少発	平年：やや少 前年：並み	1) 被害葉を除去する。 2) 薬剤散布の際は、葉の裏側にもよくかかるようにする。 3) 肥料切れさせない。
ダイコン ハクサイ キャベツ レタス	軟腐病		少発	平年：やや少 前年：並み	1) 食痕性害虫を防除する。 2) 発生が予想される場合は、 薬剤防除を行う。
キャベツ	黒腐病		少発	平年：やや少 前年：並み	1) 食痕性害虫を防除する。 2) 発生が予想される場合は、 薬剤防除を行う。
ダイコン	モザイク 病		少発	平年：やや少 前年：並み	1) アブラムシ類を防除する。

野菜名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
ニンジン	黒葉枯病	最盛期： 11月中旬	少発	平年：並み 前年：少	1) 肥料切れさせない。 2) 予防散布に努める。
ネギ	さび病		少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや多	1) 適正施肥につとめ、草勢を良好にする。 2) 同一系統薬剤の連用は避ける。 3) 薬剤防除の際には、展着剤を加用し、葉全体に薬液が付着するようにする。
全般	ヨトウムシ類		少発 (局中発)	平年：やや多 前年：並み	1) 対象作物により薬剤が異なる。
	ハスモンヨトウ	加害盛期： 10月中旬	少発 (局中発)	平年：少 前年：やや少	
	アブラムシ類		少発 (局中発)	平年：やや少 前年：並み	
アブラナ科野菜	コナガ	加害盛期： 10月中旬	少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや多	1) 有機リン系、カーバメート系薬剤の感受性低下が確認されている。
	モンシロチョウ(アオムシ)		少発	平年：少 前年：やや多	1) 対象作物により薬剤が異なる。
	タマナギンウワバ	加害盛期： 10月中旬	少発	平年：やや多 前年：多	
	キスジノミハムシ	加害盛期： 10月上旬	少発 (局中発)	平年：少 前年：やや多	
ハウレンソウ (施設)	シロオビノメイガ		少発	平年：並み 前年：並み	
ナス キュウリ ハウレンソウ (施設)	ミナミキイロアザミウマ		少発 (局中発)	平年：やや少 前年：並み	1) 本虫は寄主範囲が広いので注意する。
トマト キュウリ (施設)	タバココナジラミ		少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや多	1) 葉裏に十分にかかるように農薬を散布する。
	オンシツコナジラミ		少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや多	
トマト ナス (施設)	オオタバコガ		少発	平年：並み 前年：並み	1) 果実に食入するため若齢幼虫期に防除を徹底する。

野菜名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
トマト (施設)	ミカンキ イロアザ ミウマ		少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや多	1)施設栽培では発生に注意する。
	トマトサ ビダニ		少発	平年：並み 前年：並み	

[花き関係]

花き名	病害虫名	予 報 内 容			防除対策および 防除上の注意点
		発生時期	被害程度	発 生 量	
キ ク	白さび病		少発	平年：並み 前年：並み	1) 罹病株が周辺への伝染源となるので、抜き取り処分する。 2) 下葉を除去し、日当たり、風通しを良くする。 3) 同一系統薬剤の連用を避ける。
	アブラム シ類		少発	平年：並み 前年：やや少	1) 同一系統薬剤の連用を避ける。 2) 圃場周辺の除草に努める。
	オオタバ コガ		少発	平年：並み 前年：並み	1) 若齢幼虫期までに防除を徹底する。 2) 同一系統薬剤の連用を避ける。
	ミカンキ イロアザ ミウマ		少発	平年：並み 前年：やや少	1) 同一系統薬剤の連用を避ける。
	ハダニ類		少発 (局中発)	平年：並み 前年：やや少	1) 同一系統薬剤の連用を避ける。