

# 果樹

## 実況

### 1 ウメ

#### (1) 生育状況 (園芸研究センター)

花芽形成に影響を及ぼす8月中旬から9月上旬の日照時間は、平年並みであった。(図1)。

モンクロシャチホコの初発は、8月中旬以降であり、食害が確認されたのは8月下旬からであった。イラガの発生は平年より少なかった。ウメシロカイガラムシ第3世代幼虫は、8月25日からふ化が確認された。

#### (2) 地域状況

二州管内におけるモンクロシャチホコの発生は、若狭町三方地区を中心に前年より拡大してきている。

### 2 ナシ

#### (1) 生育状況 (農業試験場)

「幸水」の収穫は8月10日から始まり、8月22日に終了した。収穫始期・終期ともに平年より7日早かった。果実横径は、前年・平年より大きかった(図2)。糖度は12.7度で平年より高かった。

「豊水」の収穫は8月31日から始まり、9月16日に終了した。収穫始期は平年より5日早く、終期は1日早かった。果実横径は、前年・平年より大きかった(図3)。糖度は13.1度で平年より高かった。

黒星病、ハダニの発生が少し見られた。




図2 「幸水」の果実肥大(福井農試)




図1. 旬別日照時間の推移(美浜町久々子)




図3 「豊水」の果実肥大(福井農試)

#### (2) 地域状況

坂井市三国・あわら市では、「豊水」の収穫が8月25日から始まり9月23日まで収穫された。やや大玉傾向で、収穫量は昨年より多い見込み。病害虫の影響は少なく、秀品率は高い。「あきづき」の出荷は9月12日から行われている。

若狭町では、「豊水」が9月2日から、「二十世紀」が9月5日から集荷が行われた。

### 3 カキ

#### (1) 生育状況 (農業試験場)

9月21日現在の果実肥大は、果実横径で「刀根早生」が83.0(平年78.2mm、前年87.3mm)であり、平年より大きく前年より小さかった(図4)。「平核無」は82.4mm(平年75.1mm、前年83.9mm)であり、平年より大きく前年より小さかった(図5)。すす点病が少し見られる。

「刀根早生」の収穫は、10月上旬から開始予定である。




図4 「刀根早生」の果実肥大(福井農試)




図5 「平核無」の果実肥大(福井農試)

#### (2) 地域状況

あわら市における9月21日調査では、「刀根早生」の果実横径は82.0mmで前年より小さく、平年より大きい。「平核無」の果実横径は76.0mmで、前年、平年より小さい。果実の着色は平年並みで前年より遅くなっている。

「刀根早生」の収穫は、あわら市で9月27日、南越前町(南条)で9月25日、若狭町で9月26日から開始されている。

### 4 イチジク

#### (1) 地域状況

若狭管内では、9月20日現在、13~16節の果実を収穫している。

### 5 ブドウ

#### (1) 生育状況 (農業試験場)

露地栽培の収穫期は、「サニールージュ」が8月19日~9月5日(前年8月10~24日)、「ブラックビート」が8月19日~9月2日(前年8月19~24日)、「藤稔」が9月7~16日(前年8月26~28日)、「シャインマスカット」が9月7~26日(前年8月24~31日)であった。

#### (2) 地域状況

ほとんどの品種は9月上旬でほぼ収穫を終了した。

## 対 策

### 1 各樹種共通

#### (1) 土づくり

果樹の高品質・安定生産のためには土づくりが必要である。土づくり作業は、天候が不順になる前に計画的に進める。本県は有効土層の浅い樹園地が多いので、有機物や土壤改良資材を投入しながら深耕し、土づくりを行う。

地下水位の高い園では、深耕に併せて排水対策を実施する。

未熟な有機物を施用すると、有機物が分解される過程で植物体への無機態窒素の供給が一時的に減少(=窒素飢餓)したり、紋羽病を発生させたりするおそれがあるので、土づくりに用いる有機物は十分に腐熟したものを選んで用いる。

具体的な深耕方法としては、トレッチャードで樹列と平行にざんごう状に溝を掘る方法、幹を中心に放射状に掘る方法、ロータリーオガなどでたこつぼ状の穴を掘る方法がある。溝およびたこつぼ穴は40cm以上の深さが望ましく、穴には有機物の他に石灰質資材、ようりんなどの土壤改良資材を混ぜながら埋め戻す。年ごとに深耕位置を変え、数年かけて圃場全面の土づくりを行う。

## (2) 植え付け準備

今秋から来春にかけて新改植を予定している場合は、10月末までに植穴の準備を進めておく。植穴は、大きさ1m×1m、深さ50cm程度を掘り上げる。掘り上げた土の山に完熟堆肥またはバーク堆肥20kg・ようりん1kg・石灰類1kg・3要素入り肥料500gをふりかけ、山すそ部分から切りくずし、資材と土を十分混ぜ合わせながら埋め戻しを行う。また、植え付け後の沈下を考慮して地表面より中央部がやや高くなるように埋め戻しておく(図6)。

落葉果樹では11月中旬頃、かんきつ等の常緑果樹では降雪の可能性がなくなる3月頃に苗木の植付けを行う。植え穴の中で土づくり資材と土がなじむように、植え穴の埋め戻しを行った後、植付け時期まで放置しておく。

## (3) 新植・改植

収量や品質が劣る品種は、早期かつ計画的に、経済性が高い有望な品種への新植・改植を進める。なお、樹種や品種によっては売り切れになることがあるので、早めに苗木を注文しておく。

改植では、計画的に伐採・伐根、排水対策、堆肥施用による土づくりなどを行った後、前項に従い苗木を植え付ける。また、伐根ができるだけ丁寧にして、植え付け位置は前作から可能な限りずらすように配慮する。

## 2 ウメ

### (1) 高接ぎ後の新梢管理

接ぎ穂から発生した新梢の誘引がまだ実施されていない場合は、ゆ合している接ぎ木部が剥がれないように注意しながら、接ぎ木台(紅サシや剣先)に誘引する(図7)。

接ぎ木台の旧年枝を用いて誘引してある新梢は、その基部が木質化してしまう前に、旧年枝を基部から切り落とし、新たに太い枝に誘引し直す。

誘引後、新梢の長さが1.5m以上で基部が褐色になっているような強勢な新梢は2/3~4/5程度の100




図6 苗木の植付け方法




図7 誘引する方向(切り接ぎの場合)

～120cm長で、エンピツ程度の太さの新梢は60～80cm長で先端を切除する。長さ50cm以下で伸長がよくない新梢はそのままにしておく。

接ぎ木後2年目になると、多くの新梢が勢いよく伸びてくるので、長大な新梢はすべて発生基部から切除する。先端から2～3番目に発生し、枝断面の水平方向からやや上向きの新梢1本を主枝候補として残し、80～100cmの長さで切り返す(図8)。旧年枝を土台として発生した30cm以下の新梢は、おおよそ20cm程度の間隔で横向きの枝を残し、次年度の結実を確保する。

## (2) 秋季せん定

せん定は遅れないように計画的に作業を始める。ただし、葉は落葉間際まで光合成により、来年のための養分を樹に蓄えている。せん定作業は樹勢の強い樹や「新平太夫」・「福太夫」を優先し、樹勢の弱い樹はできるだけ遅らせて、葉数と着葉期間を確保して貯蔵養分を蓄積させる。また、花芽の着生が少ないと判断される場合は、切り過ぎに注意し、短果枝や中果枝などの結果枝をできるだけ多く残し、花芽数を確保する。




図8 新梢先端の処理

## 3 ナシ

### (1) 収穫後の防除

ナシ黒星病の感染条件は葉の濡れ時間が8.8時間以上、最適温度は18.5°Cとされている。感染適温の出現時期は平年で9月下旬から10月上旬である。この時期に降雨等で葉が濡れている時間が長く続くと感染が拡大する。越冬病原菌を減らすため、この時期に予防的な薬剤散布を実施する。また、落葉は翌年の発生源となるので、園外に持ち出して焼却や埋設などの処理をする。

ハダニ類・シンクイムシ類の発生が多かった園では、耕種的防除として主幹部にコモやワラ・クラフト紙などを巻き付けておき、早春に回収して焼却駆除する。

### (2) 礼肥施用

礼肥をまだ施用していない園では、施肥基準に準じて速効性肥料で年間窒素量の20%を早急に施す。

### (3) 秋季せん定

受光態勢を改善して翌年に利用する枝の芽の充実を良くするとともに、せん定した切り口の潜芽の動きだしを良くして、優良な側枝を確保することを目的に粗せん定を開始する。ただし、10月中下旬は落葉前せん定となるので、樹勢の強い樹に限って実施する。樹勢の弱い樹、ハダニ等により落葉が進んだ樹、受光態勢のよい樹では、かえってマイナスになるので落葉を待ってから作業を開始する。

## 4 カキ

### (1) 枝の補強

果実肥大が進むと枝が垂れ下がり、果実の重みで枝が折損があるので、下垂程度の大きい枝を中心に、ビニールバンドによる吊り下げや突っ支え(つかえ)棒による枝の補強をはかる。

### (2) 収穫

「刀根早生」や「平核無」など脱渋柿の糖度は、脱渋後で13度以上が必要である。

果皮の着色程度が熟度の目安となるので、カラーチャートを指標にして収穫する。「刀根早生」、「平

核無」の収穫適期は、カラーチャートで果頂部5.0～5.5、ヘタ部3.5～4.0が目安となる。収穫前半は果頂部、後半はヘタ部の果色を重視して、これより着色の進んだ果実を選んで収穫する。

カキの果実は、タンニンを多く含んでいるので、収穫の際に果皮に傷がつくと黒変する。黒変を防止するため、果実表面が傷つかないように、収穫時に果梗を基部まで短く切り戻す。また、収穫カゴの内側に布を張って使用するなど、細心の注意で果実の保護に努める。

雨や朝露でぬれた果実を収穫すると、汚染果の原因となるので、果面が乾いてから収穫する。

果実温度の急激な変化やムレは軟化の原因となるので、収穫後の果実は、直射日光を避けて風通しのよい場所で保管する。

### (3) 脱渋

収穫した後に長時間放置した果実は渋抜けが悪くなるので、収穫後すみやかにガス処理できるように配慮する。

CTS法では、果実温の上昇予措(果実温度を均一にする)を確実に行い、炭酸ガス濃度・処理時間・処理温度などの条件を厳格に守る。炭酸ガス処理が終わったら保温し、48時間後に脱渋程度を判定する。脱渋が不完全ならば更に保温を続ける。

小果は大果より脱渋反応が遅れるので、サイズの大小による脱渋程度のちがいに注意して、出荷・販売を行う。

### (4) 礼肥施用

樹の貯蔵養分を多くして、翌年の発芽や開花結実を良好にすることを目的に、10月中下旬に速効性の肥料を礼肥として施す。

## 5 イチジク

### (1) 水管理

イチジクの果実は、成熟に伴って急激に水分を吸収して肥大する。気温が低くなると葉からの蒸散量が減少するため、かん水量が多いと果実の水分含量が増加して果実は大きくなるが、糖度は低くなるので、かん水が過剰にならないよう注意する。

### (2) 収穫

収穫適期は、果皮色、着色面積割合、果実硬度から総合的に把握する。時期により適期基準は変化するので、収穫後期には果面全体に着色し、果皮色が十分に濃くなったものを収穫する。また、やや硬い果実でも収穫が可能となる。

### (3) 秋肥(礼肥)施用

果実生産によって低下していく葉の同化機能を回復させ、貯蔵養分を増加させるために窒素成分量で2 kg/10 aを10月上旬に施用する。

## 6 ブドウ

### (1) 礼肥施用

収穫後の樹勢回復と次年度の貯蔵養分蓄積のため、速効性肥料を窒素成分量で1.5kg/10a施用する。樹勢の強弱を観察して施肥量を調節する。

### (2) 秋季防除

落葉までに、越冬病原菌密度低下およびブドウトラカミキリの防除のため、ICボルドー66Dおよびスマチオン水和剤40を混用散布する。