

畜産

実況

1 平成28年度第1回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成28年4月4日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	枝肉重量 (kg)	BMS (No.)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	11	2,690	1,353,335	503.6	7.4	62.6	91
	全体	33	2,680	1,276,074	475.1	7.1	58.0	85
雌	福井	12	2,605	1,137,505	436.1	6.6	56.4	92
	全体	21	2,514	1,086,944	430.9	5.8	53.2	67

最高価格は、1,640,825円、去勢牛(勝平正×福桜×糸秀)、29.6カ月齢、A-5(BMSNo11)、枝肉重量585.8kg、ロース芯面積74cm²であり、出生地は宮崎県であった。枝肉単価は、前回より、去勢で23円高く、雌で68円高かった。

2 平成28年度第2回石川・福井合同肉牛枝肉販売会（平成28年4月18日）

		頭数	単価 (円)	販売価格 (円)	枝肉重量 (kg)	BMS (No.)	ロース芯 面積 (cm ²)	上物率 (%)
去勢	福井	22	2,770	1,350,226	488.0	6.9	58.3	91
	全体	40	2,732	1,288,847	470.7	7.0	57.6	88
雌	福井	7	2,834	1,237,985	436.3	8.0	64.7	86
	全体	25	2,666	1,131,116	423.5	6.8	58.1	72

最高価格は、1,671,345円、去勢牛(美国桜×勝乃勝×北仁)、25.1カ月齢、A-5(BMSNo9)、枝肉重量585.0kg、ロース芯面積72cm²であり、出生地は石川県であった。枝肉単価は前回より、去勢で80円高く、雌で229円高かった。

対策

1 飼料作物

- (1) イタリアンライグラス等寒地型牧草の1番草の収穫適期は出穂期なので、刈り遅れにならないように注意する。また、刈り遅れたり、予乾中降雨にあった材料は、栄養価の低下のほか、不良発酵し易いので、糖類や乳酸菌を添加するとともに、密封に十分注意する。
- (2) 2番草や3番草を採草する場合、1番草や2番草収穫後、尿素を10アールあたり10~20kg追肥し、再生を促す。
- (3) 梅雨シーズンの湿害を防ぐため、ほ場の排水の確保に努める。排水の悪いほ場には、グリーンミレットなど耐湿性の強い草種を栽培する。
- (4) 暖地型牧草を水田で栽培する場合、肥料が流亡し易いので、基肥を半量にし、残りを播種1ヶ月後に分施すると良い。
- (5) 種子の軽い暖地型牧草では播種しやすいコート種子が利用されているが、コート剤により増量されているため、播種量に注意する。ローズグラスの場合、コートしていない種子では2~3kg/10aが適量であるが、コート種子は5~6kg/10a必要である。

2 堆肥のハエ対策

堆肥を作る際は、低い水分で好気性にすることで発酵温度が65-70℃以上に上がり、ハエの卵のふ化を防止し、内部の幼虫を死滅させる。

生ふんの水分は80%以上あり、一般に副資材(敷料)を混ぜて70%以下に調整することが大切である。また、幼虫がふ化するまでの期間内(5-7日間)に切り返すことがポイントで、定期的な切り返しをすることにより堆肥の通気が良くなり、発酵温度が十分に上がる。