

# ヒロハノオオタマツリスゲ

*Carex filipes* Franch. et Sav. var. *arakiana* (Ohwi) Ohwi.

カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地は5箇所、各生育地とも個体数が多くないので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

## 分 布

本州（北陸地方から中国地方の日本海側）に分布。県内では嶺北嶺南の山地で確認されている。

## 種の特徴

山地の森林内や湿った草地に生える多年草。基部の鞘は赤紫色。葉は幅6～12mm、深緑色で、前年葉が残る。側小穂は雌性で長い柄が有り下垂する。

## 生育を脅かす要因

森林伐採。土地造成。湿地や湿地周辺の開発。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○				○										○	

# ツクバスゲ

*Carex hirtifructus* Kük.

カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地は7箇所であるが、各生育地とも群生しないので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

## 分 布

本州（近畿地方以北）から九州に分布。県内では嶺北嶺南の山地の岩場で確認されている。

## 種の特徴

本種はショウジョウスゲに似るが、全体が小型で果胞の嘴が細長く、口部がやや深い2歯となることで区別される。

## 生育を脅かす要因

気候変動に伴う生育環境の変化。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
									○								

# オキナワジュズスゲ

*Carex ischnostachya* Steud. var. *fastigiata* T.Koyama

カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地は9箇所であるが、この生育地はすべて金津地区である。産地が限られているので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

## 分 布

本州（関東地方以西）から九州、対馬、南西諸島に分布。坂井市金津地区の県境山麓で確認されている。

## 種の特徴

森林内の路傍や林縁に生える多年草。ジュズスゲの果胞は長さ4～5mmであるが、オキナワジュズスゲは長さ3～4mmと短い。

## 生育を脅かす要因

森林伐採。里地・里山の開発。植生遷移による生育環境の悪化。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
											○		○				