

キンスゲ

Carex pyrenaica Wahlenb.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は1箇所であるが、個体数や生育地の環境が安定しているため、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

北海道～本州（中地地方以北）に分布。県内では嶺北の県境山地で確認されている。

種の特徴

高山のやや湿潤な砂礫地や草地に生える多年草。花序は1個で雌雄性、やや密に花をつけ、雄部は頂部に雌部は下部につく。

生育を脅かす要因

温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

ユキグニハリスゲ

Carex semihyalofructa Tak.Shimizu
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は2箇所、個体数があまり多くないので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

本州（福井県以北の日本海側多雪地）に分布。県内では嶺北の県境山地で確認された。

種の特徴

ブナ帯上部から亜高山帯の湿地に生える多年草。葉は幅1.7～2.8mm。有花茎は20～45cm、花序は1個、上部に雄部、果胞は熟すと斜開する。

生育を脅かす要因

温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

エゾハリイ

Eleocharis congesta D.Don var. *thermalis* (Hultén) T.Koyama
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は2箇所であり、個体数も少ないので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

北海道～九州に分布。県内では奥越の山地で確認されている。

種の特徴

湿地や池の周辺に生える多年草。ハリイに似るが、穂は疎らに少数花をつけ、芽生しないこと、鱗片が濃赤色であること等で区別できる。

生育を脅かす要因

湿地の自然遷移。湿地の開発。埋立。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	