

オオダイコンソウ

Geum aleppicum Jacq.
バラ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：県域絶滅危惧II類

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地、個体数とも少ない。1山域にのみ確認されている。

分布

北海道～本州（中部地方以北）に分布する。県内では奥越地方に分布する。

種の特徴

花期は6～7月。茎の葉は羽状複葉、ダイコンソウに比べて全体が大きく側小葉とほぼ同じ大きさの托葉がある。

生育を脅かす要因

産地局限、登山者による踏みつけ、温暖化の進行が生育を脅かす。

参考文献 佐竹義輔ほか (1982b)

市町別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

ミヤマダイコンソウ

Geum calthifolium Menzies ex Sm. var. *nipponicum* (F.Bolle) Ohwi
バラ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地、個体数とも少ない。1山域にのみ確認されている。

分布

分布域は北海道、本州（中部地方以北、大峰山系）、四国（石鎚山）。県内では奥越地方に分布する。

種の特徴

岩隙、砂礫地に生育する多年生草本。高さは10～30cm。花期は7～8月、黄色い直径1.5～2cmほどの5弁花を咲かせる。頂小葉は直径2～12cmと非常に大きく、端が鋸歯で光沢がある。

生育を脅かす要因

産地局限、登山者による踏みつけ、自然遷移の進行、温暖化が生育を脅かす。

参考文献 佐竹義輔ほか (1982b)、福井県植物研究会 (1998)

市町別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

カラフトダイコンソウ

Geum macrophyllum Willd. var. *sachalinense* (Koidz.) H.Hara
バラ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地、個体数とも少ない。1山域にのみ確認されている。

分布

北海道～本州（中部地方以北）に分布する。県内では奥越地方に分布する。

種の特徴

低地～山地の森林の林縁などに生え、茎の高さは30～80cmで、全体に刺状の粗毛がある。枝先に直径約1.5cmの黄色の花を数個つける。花弁、萼はそれぞれ5個。根生葉は奇数羽状複葉で小葉は丸い。茎葉は単葉で、3個に浅～中裂し縁には粗い鋸歯がある。花期：5～7月。

生育を脅かす要因

産地局限、温暖化の進行等が生育を脅かす要因となる。

参考文献 佐竹義輔ほか (1982b)

市町別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	