

コウキヤガラ

Bolboschoenus koshevnikovii (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnik. **カヤツリグサ科**

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は5箇所である。生育地、個体数ともに少ないので、県域準絶滅危惧とした。

分 布

日本全土に分布。県内では嶺南、嶺北の海岸で確認されている。

種の特徴

海岸近くの湿地に生育する多年草。横走する根茎があり、先端に塊茎を作る。小穂は2個以上つける。柱頭は2岐。

生育を脅かす要因

海岸開発。

参考文献 福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
				○													○

ハリガネスゲ

Carex capillacea Boott **カヤツリグサ科**

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は8箇所である。多くの生育地は丘陵地の小さい湿地に生え、個体数が減少しているため、県域準絶滅危惧とした。

分 布

北海道、本州～九州に分布。県内では嶺南、嶺北の低地の小さい湿地で確認されている。

種の特徴

平地の湿地に生える多年草。茎は細いが硬い。有花茎は高さ20～40cm。果胞は熟して平開する。果胞の稜間には5～9脈がある。

生育を脅かす要因

湿地開発。林道の拡幅、新設。

参考文献 福井県植物研究会（1998）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
						○							○		○	○	

コハリスゲ

Carex hakonensis Franch. et Sav. **カヤツリグサ科**

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は3箇所であるが、個体数が多いので、県域準絶滅危惧とした。

分 布

北海道～九州に分布。奥越の県境山地や嶺南で確認されている。

種の特徴

ブナ帯～亜高山帯の樹林内に生える多年草。ハリガネスゲより小型。果胞はほとんど無脈で、熟してもあまり膨らまない。

生育を脅かす要因

温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
						○									○	○	