

ヒトモトスキ

Cladium jamaicense Crantz subsp. *chinense* (Nees) T.Koyama
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は13箇所であるが、近年個体数が減少しているため、県域準絶滅危惧とした。

分 布

本州（新潟県、茨城県以西）～南西諸島に分布。県内では嶺南の海岸、三方五湖で確認されている。

種の特徴

海岸の湿地に生える大型の多年草。有花茎は高さ1～2m。葉は硬くて厚く、縁と中肋に鋸歯がありざらつく。

生育を脅かす要因

海岸開発。遊覧船の運航による波の影響。

参考文献 福井県植物研究会（2001）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○	○	○		○											

シロガヤツリ

Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は10箇所であるが、いずれの生育地も個体数が多くないので、県域準絶滅危惧とした。

分 布

北海道～本州（近畿地方以東）に分布。県内では嶺北嶺南で確認されている。

種の特徴

池や湿地に生える軟らかい一年草。有花茎は5～20cm。茎の頂部に小穂が集合し、白色を帯びる。瘦果の縁は狭い翼状になる。

生育を脅かす要因

河川敷の改修。溜池の改修、管理放棄。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
						○					○		○		○		○

ヒメアオガヤツリ

Cyperus pygmaeus Rottb.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地点は2箇所である。生育地は限られ、個体数も少ないので、県域準絶滅危惧とした。

分 布

本州（宮城県以西）～九州に分布。県内では嶺北や嶺南の低地で確認されている。

種の特徴

日当たりの良い、溜池の砂地に生える一年草。シロガヤツリに似るが、瘦果の稜に翼がなく、鱗片は常に2列である。

生育を脅かす要因

溜池の改修、管理放棄。河川改修。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
						○											○