

トキリマメ

Rhynchosia acuminatifolia Makino

マメ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

主に嶺南で確認されているが、個体数は少ない。

分 布

本州（宮城県以西）、九州に分布。県内では嶺南全域と越前市で記録がある。

種の特徴

低山地の林縁に生えるつる性の多年草。タンキリマメより全体に毛が少ない。花期は6～9月で、花は黄色。豆果は紅熟し、黒い種子が1～2個入る。

生育を脅かす要因

森林伐採、管理放棄。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○	○	○		○						○					

リンボク

Laurocerasus spinulosa (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.

バラ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

分布上日本海側の北限で、生育地、個体数とも少ない。

分 布

本州（茨城・福井以西）、四国、九州に分布。県内では嶺南に分布する。

種の特徴

森林、特に谷間によく生える常緑の高木。樹皮は黒～褐色。葉は互生、表面は深緑色。葉身は倒披針形または楕円形。葉の鋸歯が鋭く尖って針状になる。なお、大木になるとこの鋸歯自体が無くなる。花は秋に咲く。

生育を脅かす要因

森林伐採が生育を脅かす。

参考文献

奥田重俊編（1997）、福井県植物研究会（1999）、福井県樹木誌（2011）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○			○												

ゴヨウイチゴ

Rubus ikenoensis H.Lév. et Vaniot

バラ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

本県を分布限界とし、生育地、個体数とも少ない。

分 布

本州（中北部地方）に分布する。県内では奥越地方で確認される。

種の特徴

針葉樹林帯にはえる草本状のつる性木本。茎には針状の細かい刺が密生する。葉は互生、5出複葉の鳥足状で、5枚の小葉からなり、縁は重鋸歯になる。花期は6～7月、花弁は退化し線状で目立たない。果実は秋に赤く熟す。

生育を脅かす要因

産地局限。

参考文献

佐竹義輔ほか（1982b）、福井県植物研究会（1999）、福井県樹木誌（2011）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	