

ハクサンフウロ

Geranium yesoense Franch. et Sav. var. *nipponicum* Nakai
フウロソウ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

産地に限られる。

分 布

本州中部以北に分布。県内では奥越にのみ分布する。

種の特徴

亜高山帯の草地に生える多年生草本。高さ30～60cm。葉は掌状に5～7深裂し、幅5～10cm、裂片は中裂する。花期は7～8月。花は紅紫色、直径2.5～3cm、花弁は5枚。蒴果は長さ約3cm、下部から5裂し巻き上がる。

生育を脅かす要因

産地局限。

参考文献 門田裕一ほか（2013）、福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市	
																	○	

エゾフウロ

Geranium yesoense Franch. et Sav. var. *yesoense*
フウロソウ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

産地に限られる。

分 布

北海道から本州中部以北に分布。県内では奥越にのみ分布する。

種の特徴

高山の草地に生える多年生草本。高さは30～60cm。茎や葉柄、萼片に下向きの開出毛が密生する。葉は掌状に5裂し、幅5～10cm、裂片はさらに中裂する。花期は7～8月。花は紅紫色、直径約3cm、花弁は5個で重なる。萼片には開出毛が密に生える。

生育を脅かす要因

産地局限。

参考文献 清水建美ほか（2014）、佐竹義輔ほか（1982b）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市	
																	○	

ミズマツバ

Rotala mexicana Cham. et Schltdl.
ミソハギ科

【福井県カテゴリー】新：県域準絶滅危惧 旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類

選定理由

湿地環境の消失や、農薬の多用によって著しく減少した。生育環境が維持されにくい。

分 布

本州中部以西から九州に分布。県内各地で局所的に見られる。

種の特徴

水田や湿地に生える一年生草本。高さ3～10cm。葉は3～4個輪生し、狭披針形、長さ0.6～1cm。花期は8～10月。花は葉腋につき、淡紅色、直径0.8mm。萼片は5個、花弁は無い。蒴果は球形、3裂する。

生育を脅かす要因

圃場整備、農薬汚染、自然遷移。

参考文献 林弥栄ほか（2013）、福井県植物研究会（1998）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
		○			○	○		○	○	○		○			○		○