

# タニガワスゲ

*Carex forficula* Franch. et Sav.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地は8箇所だが、どの生育地も個体数が多くないので、要注目とした。

## 分 布

北海道～九州に分布。県内では嶺北で確認されている。

## 種の特徴

溪流や山地の湿地に生える多年草。叢生して大きい株になる。葉の表面は濃緑色、裏面は粉白色である。果胞の嘴は長く両側がざらつく。

## 生育を脅かす要因

用水路改修、湿地開発。

参考文献 福井県植物研究会（1998）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
										○		○			○	○	

# イトキンスゲ

*Carex hakkodensis* Franch.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地は1箇所であるが、生育地は開発の心配のない亜高山であるため、要注目とした。

## 分 布

北海道～本州（中部地方以北）。県内では嶺北の亜高山で確認されている。

## 種の特徴

高山の湿った砂礫草に生える多年草。葉は茎より短く、縁はざらつく。花序は1個で雌雄性、雄部は頂部につき短く、雌部は長く密に花をつける。

## 生育を脅かす要因

温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																	○

# ハタベスゲ

*Carex latisquamea* Kom.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】絶滅危惧ⅠB類

## 選定理由

既知の生育地は1か所だが、現在は確認できずに奥越高原牧場造成以前に池ヶ原湿原で採集された標本があるのみ。

## 分 布

北海道、本州（中部地方以北）、九州に分布。県内では池ヶ原湿原で確認された。

## 種の特徴

湿った草に生える多年草。葉は深緑色で、まばらに毛がある。基部の鞘は赤褐色でまばらに毛がある。

## 生育を脅かす要因

湿地開発、埋立。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○		