

イトヒキスゲ

Carex remotiuscula Wahlenb.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類

選定理由

既知の生育地は1か所で、1回しか採集されていない。今後情報を集める必要があるために要注目とした。

分 布

北海道～本州（長野県、福井県）に分布。大野市五箇地区で採集されている。

種の特徴

山地の林床や細流の脇等に生える多年草。植物全体が繊細で細く、小穂が少なく、果胞の長さ約3mmと小さい。

生育を脅かす要因

土地造成、森林伐採、温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

ヒメモエギスゲ

Carex tristachya Thunb. var. *pocilliformis* (Boott) Kük.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は十数箇所であるが、生育地の開発や環境変化等により容易に減少する恐れがあるので、要注目とした。

分 布

本州（関東以西）から九州に分布。県内では嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

林床や林縁に見られる多年草。モエギスゲに似るが、雄鱗片は縁が癒合して筒状（コップ状）になる。

生育を脅かす要因

土地造成、林道拡幅。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○		○			○					○		○				○

ヒメガヤツリ

Cyperus tenuispica Steud.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は4箇所だが、近年は確認されていないので、要注目とした。

分 布

本州から九州に分布。嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

日当たりの良い湿地や水田などに生える多年草。コアゼガヤツリに似るが、匍匐根茎がなく、小穂の鱗片に芒がないことで区別できる。

生育を脅かす要因

水田の圃場整備、土地造成、農薬の散布。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○							○				○					○