

ツルフジバカマ

Vicia amoena Fisch. ex Ser.
マメ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

県内のあちこちで採集記録があるが、稀にしかみられない。

分 布

北海道～九州に分布し、県内一円で記録されている。

種の特徴

山野の草地にみられるつる性の多年草。葉は長さ 15 cm で先端は巻きひげになり、小葉は 10～16 枚で互生する。花期は 8～10 月、長さ 4～15 cm の総状花序に紅紫色の花が偏ってつく。

生育を脅かす要因

草地の開発、管理放棄。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
					○					○				○		○	○

オオバクサフジ

Vicia pseudo-orobus Fisch. et C.A.Mey.
マメ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

奥越地方で記録があるが、最近 30 年の情報はない。

分 布

北海道から九州に分布し、県内では大野市と勝山市で記録がある。

種の特徴

山野の草原に生えるつる性の多年草。葉は長さ 7～20 cm、先端は巻きひげとなる。小葉は互生し、4～10 枚。花期は 8～10 月。長さ 4～7 cm の総状花序に青紫色の花を多数つける。

生育を脅かす要因

草地の開発、管理放棄。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	

エビラフジ

Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim. subsp. *cuspidata* (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. *cuspidata* Maxim.
マメ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

1996 年に 2 箇所て採集されたが、現状は不明。

分 布

本州の日本海側（山形県～京都府）に分布。県内では池田町と福井市で記録されている。

種の特徴

山地に生える多年草。茎は直立し、高さ 80～100 cm。葉は 8～12 枚の小葉をほぼ対生につける。小葉の先は長くとがる。花期は 6～9 月。総状花序に紅紫色または青紫色の花を偏ってつける。

生育を脅かす要因

森林伐採、遷移の進行。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
									○								○