

オオキヌタソウ

Rubia chinensis Regel et Maack f. *mitis* (Miq.) Kitag.
アカネ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

県内ではもともと個体数が少ない。

分 布

北海道～九州に分布。県内では永平寺町、池田町、福井市、勝山市、大野市での記録がある。

種の特徴

山地の林床に生える高さ30～60cmの多年草。匍匐する長い地下茎を持つ。茎は4稜があり無毛。葉は狭卵形～広披針形で、4枚が輪生する。葉脈が目立ち、短い柄がある。5～7月、茎の先や葉腋に集散花序をつける。花冠は緑白色で径3～4mm。液果は黒く熟す。

生育を脅かす要因

シカ食害、森林伐採。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
									○	○					○	○	○

オオアカネ

Rubia hexaphylla (Makino) Makino
アカネ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

産地局限。

分 布

本州（中部地方）、九州（北部）に分布。県内では大野市での記録がある。

種の特徴

山地帯を中心として森林の林縁に稀にみられるつる性の多年草。茎は4稜があり、稜上に下向きの刺がある。葉は3角状卵形で薄く、ふつう主軸に6～8枚、枝には4枚が輪生する。8月、葉腋から集散花序を伸ばし、花径約3mmの黄緑色の目立たない花をつける。

生育を脅かす要因

森林伐採。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

ヒナギキョウ

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC.
アカネ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地は限られ、個体数も少ない。

分 布

本州（関東地方以西）～琉球、小笠原に分布。県内ではおおい町、小浜市、若狭町、美浜町、あわら市、永平寺町、坂井市、福井市での記録がある。

種の特徴

低山や原野の日当たりの良い草地に生える多年草。茎はやや分枝し、高さ20～40cmになる。葉は全縁または波状の鋸歯があり、茎の下部ではへら形または倒披針形、上部では線状披針形。5～8月、約20cmの長い柄の先に淡青色の小さな花を1個ずつ上向きにつける。

生育を脅かす要因

植生遷移、土地造成。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○		○	○					○	○		○				○