

トウオオバコ

Plantago japonica Franch. et Sav.
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地が限定されており、個体数も少ない。

分 布

本州～九州に分布し、県内の海岸で確認されている。

種の特徴

海岸の草地に生える多年草。オオバコに比べ全体に大型で、葉身は長さ 8～25 cm、幅 5～18 cm、葉柄は長さ 3～20 cm。花期は 7～8 月。花茎は長さ 40～80 cm、1～5 個伸ばす。

生育を脅かす要因

海岸の開発。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
		○				○	○		○		○		○				○

ヒヨクソウ

Veronica laxa Benth.
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

生育地に限られ、個体数も少ない。

分 布

北海道（西南部）、本州、四国に分布し、県内一円の低地から亜高山で確認されている。

種の特徴

日当たりのよい草地に生える多年草。茎は高さ 25～70 cm、やや密に軟毛がある。葉は対生し、長さ 2～4.5 cm、幅 1～3 cm、上部のものほど大きく、両面に軟毛がある。花期は 6～7 月。上部の葉腋から長さ 5～20 cm の花序を出し、淡紅紫色～淡青紫花を多くつける。

生育を脅かす要因

生育地となる草地の管理放棄。

参考文献

福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○		○	○	○	○					○				○	○

ミヤマクワガタ

Veronica schmidtiana Regel subsp. *senanensis* (Maxim.) Kitam. et Murata
オオバコ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

奥越の亜高山の一部で記録されているが、ここ 50 年確認されていない。

分 布

本州中部の高山などに分布する。県内では大野市の三ノ峰で 1962 年に確認されている。

種の特徴

ブナ帯以上の山地～高山の岩礫地に生える多年草。茎は高さ 10～25 cm、まばらに毛がある。葉は対生して下部に集まり、葉身は卵状長楕円形、長さ 1～3 cm、幅 0.5～1.5 cm。葉柄は長さ 1.5～5 cm。花期は 7～8 月。花冠は深く 4 裂し、青紫色～紅紫色、濃いすじがある。

生育を脅かす要因

産地局限。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	