

ブッポウソウ

Eurystomus orientalis (Linnaeus)
ブッポウソウ目・ブッポウソウ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧ⅠB類

選定理由

生息可能メッシュでの生息記録の有無から算出した出現率は56%であったが、その多くが渡り時期の記録で、繁殖記録は稀であった。かつては本県の良好なブナ林等には、本種が生息し繁殖していたことから、急激な減少は明らかである。

種の特徴

全長約30cmで、ハトより少し小さく、翼は長い。頭部はすすぐ黒、体は青緑色で翼には白斑がある。嘴と足は赤い。空中で、甲虫類やトンボ類の大形昆虫を捕食する。

分布

夏鳥として、本州～九州の山地の林や里山林等に渡り、樹洞や木製の電柱、橋脚等に営巣する。本県では、低山～山地の林で記録があるが少ない。

生息を脅かす要因

奥越地方で本種がかつて繁殖していた林は、今も変わらずに残存しているが、その多くで個体はみられない。里山の枯マツ林での記録が増えているが、一時的である。繁殖には、樹洞と多様な大形昆虫相が必要であるため、巣穴のある枯れ木の保存や巣箱設置、昆虫相の保全等の対策が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、高野（2015）、中村・中村（1995）、大西ら（2014）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○				○			○						○		○	○

ヤイロチョウ

Pitta nympha Temminck & Schlegel
スズメ目・ヤイロチョウ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧ⅠB類

選定理由

繁殖期の記録は大変少なく生息地が限定される。また、生息可能域を抽出して行った調査でも、出現率は約半数に留まった。さらに本県での繁殖行動は、過去に鳴き交わしが1件あるだけの希少種である。

種の特徴

全長18cmで、足が長く、尾羽は短い。赤、茶、緑、コバルト、黄、黒等で装飾された光沢のある美しい羽色をしている。手入れされた森林の地上で、ミミズや昆虫類を探食する。繁殖期は稜線の木の上を移動しながら、よく通る「ホヘン ホヘン」という声で鳴く。

分布

数少ない夏鳥として、本州中部～九州の低山のよく茂った林に飛来する。2005年に、嶺北南部で3羽の鳴き交わし等の行動が観察されたが、繁殖は確認はされなかった。

生息を脅かす要因

生息地となる深い茂った森林の伐採や道路建設による分断、シカの増加による林層の変化等の森林生態系の変化が生息を脅かす。他県では、八色の名のとおり美しい羽色に憧れたカメラマンのテープを使ったおびき寄せによる、繁殖行動の妨害が起こっている。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、大西ら（2014）、高野（2015）、中村・中村（1995）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
				○	○			○							○	○	

チゴモズ

Lanius tigrinus Drapiez
スズメ目・モズ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧ⅠA類

選定理由

本種は国レベルで減少が著しく、絶滅危惧ⅠA類に選定されている。本県では2013年6月にテクノポート福井において、約30年ぶりに1個体が記録された。このことから現在も渡り際に本県を通過していることが確認されたが、個体数が極めて少なく絶滅危険度が高い。

種の特徴

全長18.5cmで、頭上が青灰色、背と尾は赤褐色、下面是白い。過眼線は黒くて眉斑はない。雌は胸側～脇に褐色の横斑がある。明るい雑木林に生息し、昆虫類のほか、カエルやヘビ等の両生・爬虫類、ネズミを食べる。

分布

夏鳥として本州中部～東北地方で繁殖する。アカマツ林等の明るい林を好む。本県では旅鳥として1970～80年代に数件の記録があったが、それ以降は記録が途絶えていた。

生息を脅かす要因

国レベルで減少傾向が著しく、本県の記録も大変稀であるため、渡り期の一時的な利用環境の保全も重要である。本種はアカマツ林等の明るい林に生息し小動物を捕食することから、適度な林の管理を行い、薬剤散布を避け、現状の生態系を保全する配慮が必要となる。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、中村・中村（1995）、高野（2015）、大西・真木（2000）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
												○					○