

マガン

Anser albifrons (Scopoli)
カモ目・カモ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：県域絶滅危惧II類

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

宮城県では増加しているが北陸や山陰では減少している。本県では飛来数が一時的に2,000羽前後に増加後、最近は1,000羽程度に減少している。分布域も、かつては丹南～福井市南部にまで広がっていたが、現在は坂井平野の一部に狭窄り、種の存続が危惧される。

種の特徴

全長72cmで、体は灰褐色、腹には不規則な黒の横縞があり、上・下尾筒は白く尾羽の先は白い。足は橙色で、嘴は桃橙色で先端は白く基部は白い。10～3月中旬頃まで、広い水田に群れで飛来し、イネの落穂や二番穂、オオムギ、イネ科の水田雑草等を採食する。

分 布

冬鳥として、本州中部以北や北陸～山陰の日本海側に、約10数万羽が局地的に渡来する。本県では坂井平野が越冬地であるが、嶺南地域や丹南地域でも一時的に少数が飛来する。

生息を脅かす要因

道路網の整備による都市化や採食エリアでの秋耕作や転作により、安心して効率的な採食が行える、広く連続した二番穂水田が減少している。広い水田地帯を横断する道路整備の制限、「ふゆみずたんぼ」の推進や二番穂の育成、転作場所の配慮が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、高野（2015）、吳地（2006）、牛山・天野（2006）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○				○						○	○	○				○

コクガン

Branta bernicla (Linnaeus)
カモ目・カモ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：県域絶滅危惧II類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧II類

選定理由

世界全体で約50万羽が生息していると推定される。東アジア個体群は1万羽程度で最も保護が必要といわれ、日本には2015年に2,000羽以上が渡来している。本県は定期的な飛来地ではないが断続的に飛来し、餌場となる藻場もあるので、重要な種である。

種の特徴

体長61cmで、マガモより少し大きいくらいの小形のガンである。全体に黒く、下尾筒とわき腹が白く、嘴と足は黒色である。首の上部に目立つ白い輪がある。越冬地や中継地では、特にアマモ類を採餌し、またアオノリやアオサ等の海藻類、陸地のイネ科植物も食べる。

分 布

冬鳥として、主に北日本の海岸に局地的に飛来する。本県の坂井平野では、マガン群中や単独で、1994年、1998年、2011年に1羽、2013年に2羽の記録がある。

生息を脅かす要因

あわら三国海岸の浅い海と海草や海藻の藻場を、周辺林や自然の海岸線を含めて減少させないようにすることが重要である。また、九頭竜川河口付近の水生植物の保全や、安心して効率的な採食が行える、広く連続した二番穂水田を確保するための対策が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、高野（2015）、藤井（2015）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
											○		○				

オシドリ

Aix galericulata (Linnaeus)
カモ目・カモ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧II類 旧：県域準絶滅危惧

【環境省カテゴリー】情報不足

選定理由

今回実施した生息可能地での網羅的な調査の出現率は、51%に過ぎなかった。また、全国一斉ガンカモ調査では、1980年代までは数十羽～百羽程度が記録されていたが、1990年代以降は数羽～数十羽に減少しており、現在も同様の状態が継続している。

種の特徴

全長45cm、雄の羽色は美しく特徴的である。特に冠羽状の後頭の羽毛と、三列風切の最内羽の橙色の銀杏形が目立つ。足は橙色、嘴は紅色で先端が白い。雌は全身が灰褐色で、アイリングが白くそのまま眼の後方に伸びる。植物食中心の雑食性で、特にドングリを好む。

分 布

主に本州～九州で繁殖し、越冬地は西日本に多い。本県では、夏季に山間部の湖沼や河川等に生息し、周辺の山林の樹洞に営巣する。秋季は個体数が増加するが、冬季は少ない。

生息を脅かす要因

本種の生息を確保するには、営巣可能な樹洞のある大木と、ドングリ類をはじめとする多様な種子が実る落葉広葉樹林が必要である。そのため、大径木林とその周辺の落葉広葉樹林の伐採が生息を脅かす。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、中村・中村（1995）、高野（2015）、日本野鳥の会福井県（2015）

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○