

トモエガモ

Anas formosa Georgi

カモ目・カモ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類

選定理由

国際的な希少種で、本県でも100～300羽程度が越冬しているが、鳥インフルエンザ等で大量死することもあり、急激な減少が引き起こされる危険性が常にある。

種の特徴

全長40cm、雄の顔には黄白色と黒色の巴形の特徴ある斑紋がある。肩羽は長く、胸の横には白い線がある。雌はほかの小形のカモと比べると赤褐色味があり、嘴の付け根に淡色斑がある。夜間に水のある水田で、イネ科やタデ科等の種子や植物片を食べる。

分 布

冬鳥として、本州中部以南の日本海側に多く渡来し、太平洋側では少ない。本県の過去10年間の主な渡来地は、菅湖、小浜湾、大堤等に限られている。

生息を脅かす要因

畦となる湖沼環境の悪化、餌場となる畦周辺の水田の乾田化や転作等による餌場環境の悪化が懸念される。本種の渡来地は、ほかのカモ類と違い特定の湖沼に限られていること、また鳥インフルエンザの発生によって大量死することがあり、越冬地を分散させるためにも既存の渡来地の保全は重要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県自然環境保全調査研究会（1999）、福井県（2002）、中村・中村（1995）、高野（2015）、大西・真木（2000）

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○				○						○	○	○	○	○		○

ササゴイ

Butorides striata (Linnaeus)

ペリカン目・サギ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域準絶滅危惧

【環境省カテゴリー】—

選定理由

1990年代は九頭竜川や日野川でもよく観察され、繁殖していたと推察されるが、最近の洪水対策による河川改修により、みられなくなった地域がある。現在、県内で安定して生息し繁殖しているのは、嶺南の2河川とその周辺の2か所の社叢林のみとなっており、絶滅の危機が増大している。

種の特徴

全長52cmで、よく似たゴイスギとは一回り小さい。河川や湖沼等の平地の水辺に生息し、集団または単独で、河畔林、周辺の社叢林、屋敷林、公園緑地、街路樹等に営巣する。立ち止まって獲物を待ち伏せし、小魚、甲殻類、両生類等を捕食する。

分 布

夏鳥として北海道南部～九州の河川や湖沼等で繁殖するが、九州南部では冬に留まり、薩南諸島以南では冬鳥である。本県では河川周辺に生息するが、局地的で個体数も少ない。

生息を脅かす要因

河川改修に伴う河畔林の伐採に大きな影響を受ける。水田の乾田化や水路のコンクリート化により、餌となる水生動物が減少し、捕食環境が減少する。本種が生息している河川においては、河川改修時に、本種の生息環境を保全する配慮が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、福井県（2002）、中村・中村（1995）、大西・真木（2000）、高野（2015）、三上（2014）

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
		○		○	○	○					○	○		○			○

コサギ

Egretta garzetta (Linnaeus)

ペリカン目・サギ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

かつては、湖沼や河川、水田等で普通に観察されたが、出現率が急激に低下している。また、かつて集団営巣地は河川敷のヤナギ林にあったが、現在は、人間との軋轢が生じる林に形成されることが多く、伐採や追い払いによって営巣地が安定していない。

種の特徴

全長61cmの小形の白鷺である。全身が白く、嘴が黒くて長く足も黒いが、足指は黄色い。低地のみならず山地の水田、湖沼、河川等の水辺にも生息し、ドジョウ、フナ、ウグイ、オイカワ等の小魚、カエル類、アメリカザリガニ等を捕食する。

分 布

本州～九州で繁殖し、冬季にもみられる。本県内の水辺でも、周年、記録される。社叢林、孤立林、山林、島嶼等で、ほかのサギ類と集団で繁殖するが、嶺南地方は少ない。

生息を脅かす要因

ヤナギ林で営巣しなくなった原因は、洪水対策による伐採やアライグマの分布拡大による攪乱等と推察される。さらに本種の急激な減少は、外来魚の分布拡大による小魚の減少が原因であるという報告があり、本種をはじめサギ類の個体数変動はモニタリングしていく必要がある。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会（1998）、日本野鳥の会福井県支部サギ類調査グループ（2010）、高野（2015）、中村・中村（1995）、平野（2011）、嶋田ら（2005）

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○