

## コマドリ

*Luscinia akahige* (Temminck)  
スズメ目・ヒタキ科

【福井県カテゴリー】新：地域個体群（繁殖）旧：—

【環境省カテゴリー】—

### 選定理由

本県は、本種の国内の繁殖分布域の周辺部に位置する。また本県の繁殖分布域は、高標高の森林であるため、生息域が限定されて記録も少なく、地域個体群として重要である。

### 種の特徴

全長 14 cm、頭部から上胸は赤褐色、背と翼は暗橙褐色、下胸は黒い。本県では 4 月中旬に里山の沢筋に飛来する。夏季には県境の森林帯へ移動し、沢筋や林床のコケが生えた地上で、昆虫類やクモ類を飛びつき法で食べる。繁殖期を通して「ヒンカララ」と大きな声で囁く。

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
									○						○	○	

## ルリビタキ

*Tarsiger cyanurus* (Pallas)  
スズメ目・ヒタキ科

【福井県カテゴリー】新：地域個体群（繁殖）旧：—

【環境省カテゴリー】—

### 選定理由

本県における本種の繁殖分布域は、亜高山帯の針葉森林に限られており、国内の繁殖分布域の周辺部に位置するため、地域個体群として重要である。

### 種の特徴

全長 14 cm で、雄の体は上面と尾はルリ青色、下面是白色、脇は橙黄色で、雌の上面はオリーブ褐色で尾には青味がある。夏季は亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、冬季は平地～山地の薄暗い林で単独で越冬し、狭い縄張りを持つ。穏やかな日には囁くこともある。

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	

## クロジ

*Emberiza variabilis* Temminck  
スズメ目・ホオジロ科

【福井県カテゴリー】新：地域個体群（繁殖）旧：—

【環境省カテゴリー】—

### 選定理由

本県における本種の繁殖地は、奥越の山地帯に限られている。また本県の生息地は、国内の繁殖分布の周辺部に位置しており、貴重である。

### 種の特徴

全長約 17 cm、雌雄異色で、雄は全身青黒色、雌は灰黄褐色であり、いずれも背に黒い縦斑がある。冬季は常緑林やスギ林で種子を食べるが、繁殖期はガ類の幼虫等の昆虫類も採餌する。薄暗い林を好む。

### 分 布

九州北部に夏鳥として飛来し、高い山のクマザサ等が茂る渓谷や斜面に生息する。本県では、県境に近い標高 1,000m 以上の針広混交林の沢筋や暗い林床に生息し繁殖する。

### 生息を脅かす要因

県境に近い標高 1,000m 以上の針広混交林が繁殖域であるが、記録は少なく、その範囲の広がりを把握しているとは言えないため、県境部の森林地帯における夏季のモニタリング調査が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会 (1998)、中村・中村 (1995)、高野 (2015)、大西・真木 (2000)

市町別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	